

妇产科护理学-题库

1、固定子宫颈于正常位置的子宫韧带是：

- A、 宫骶韧带
- B、 主韧带
- C、 阔韧带
- D、 圆韧带
- E、 骶结节韧带

答案： B

解析：主韧带维持子宫于正常位置，阔韧带维持子宫在盆腔正中位置，圆韧带维持子宫于前倾位置，宫骶韧带间接维持子宫于前倾位置。

2、关于子宫峡部,下列描述正确的是

- A、 为子宫颈的一部分
- B、 上端为组织学内口
- C、 非孕时长度为 1cm
- D、 妊娠期变软不明显
- E、 临产后形成子宫下段达脐平

答案： C

解析：子宫体和子宫颈之间最狭窄的部分，为子宫峡部，在非孕期长约 1cm。

3、某女士,已婚,月经规律,月经周期第 28 天取子宫内膜检查所见:腺体缩小,内膜水肿消失,螺旋小动脉痉挛性收缩,有坏死、破裂,内膜下血肿。该内膜为

- A、 月经期
- B、 增生期
- C、 分泌早期
- D、 分泌期
- E、 月经前期

答案： E

解析：月经前期为黄体退化阶段，在黄体退化时，会出现雌、孕激素水平逐渐下降，两种激素的减退会使内膜间质水肿消退变致密，致血管受压而使血流淤滞，最后会出现局部血管的痉挛性收缩，内膜缺血、坏死，以及血管破裂出血等。该患者的表现提示其处于黄体退化阶段，即该内膜为月经前期。故本题选 E。

4、直接维持子宫前倾位置的韧带是

- A、 骶结节韧带
- B、 阔韧带
- C、 主韧带
- D、 骶棘韧带
- E、 圆韧带

答案： E

解析： 子宫韧带是子宫附件的一部分,其主要功能是固定子宫,共包括 4 条韧带,分别是子宫主韧带、子宫阔韧带、子宫圆韧带和宫骶韧带。子宫主韧带维持子宫颈正常位置;子宫阔韧带可限制子宫向两侧倾倒;子宫圆韧带维持子宫前倾位;宫骶韧带与子宫圆韧带共同维持子宫的前倾前屈位。可见,本题的正确答案是 E。

5、符合雌激素生理作用的是

- A、 降低妊娠子宫对缩宫素的敏感性
- B、 使子宫内膜增生
- C、 使宫颈黏液减少变稠,拉丝度减少
- D、 使阴道上皮脱落加快
- E、 通过中枢神经系统有升温作用

答案： B

解析： 雌激素促进阴道、子宫、输卵管和卵巢本身的发育,同时子宫内膜增生而产生月经。雌激素还能促使皮下脂肪富集,体态丰满;乳腺增生,乳头、乳晕颜色变深,并产生性欲;促使体内钠和水的潴留,骨中钙的沉积等。

6、排卵后使基础体温升高 0.3-0.5℃的激素是

- A、 促卵泡素
- B、 雌激素
- C、 孕激素
- D、 雄激素
- E、 肾上腺素

答案： C

7、关于骨盆组成的描述,正确的是

- A、 由 2 块髌骨、1 块髌骨和 1 块尾骨组成
- B、 由 1 块坐骨、耻骨联合和 1 块尾骨组成
- C、 由 2 块髌骨、1 块骶骨和 1 块尾骨组成

D、 由 2 块髌骨、1 块坐骨和 1 块尾骨组成

E、 由 2 块髌骨、1 块坐骨和 1 块尾骨组成

答案： C

8、胎先露是指

A、 胎儿长轴与母体长轴关系

B、 胎儿在子宫内所取的姿势

C、 最先进入骨盆入口平面的胎儿部分

D、 胎儿指示点和骨盆关系

E、 胎儿枕骨和骨盆关系

答案： C

解析：最先进入骨盆入口的胎儿部分称为、胎先露。胎体纵轴与母体纵轴的关系称为胎产式。胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系称为胎方位。故本题选 C。

9、关于四步触诊哪项不对

A、 前三步,检查者均面向孕妇头部

B、 第四步面向孕妇足部

C、 第二步触诊主要查胎背四肢在何侧

D、 第三步主要检查先露大小

E、 第四步主要了解先露部入盆程度

答案： D

解析：做前三步手法时检查者面向孕妇,第四步时,检查者面向孕妇足端。第一步,两手置于子宫底部了解子宫外形并摸清宫底高度,估计胎儿大小与妊娠周数是否相符。第二步,两手置于腹部两侧摸清肢体和胎背。第三步,右手拇指与其余 4 指分开,置于耻骨联合上方握住胎先露部,进一步查清是胎头或是胎臀,左右推动以确定是否衔接。第四步,两手置于先露部两侧,向骨盆入口处深压,核对胎先露部及入盆的程度。故本题选 D。

10、胎盘由下列哪些组织构成

A、 平滑绒毛膜、包蜕膜、羊膜

B、 平滑绒毛膜、底蜕膜、真蜕膜

C、 叶状绒毛膜、包蜕膜、真蜕膜

D、 叶状绒毛膜、底蜕膜、羊膜

E、 叶状绒毛膜、底蜕膜、真蜕膜

答案： D

解析：胎盘由叶状绒毛膜、底蜕膜、羊蜕膜组成。因此本题答案为 D。

11、孕妇, 24 岁, 妊娠 20 周来院进行产前检查, 目前产妇进行产前检查的频率应当是

- A、 每 1 周一次
- B、 每 2 周一次
- C、 每 3 周一次
- D、 每 4 周一次
- E、 每 5 周一次

答案： D

解析：产前检查从确诊早孕开始, 妊娠 28 周前每 4 周检查一次, 妊娠 28 周后每 2 周查一次, 妊娠 36 周后每周查一次。凡属高危妊娠者, 应酌情增加产前检查次数。

12、患者女性, 24 岁。平素月经规律。现停经 52 天, 黄体酮试验无出血, 最可能的诊断是

- A、 子宫内膜炎
- B、 早期妊娠
- C、 继发性闭经
- D、 卵巢早衰
- E、 宫颈粘连

答案： B

解析：题干给出黄体酮试验无出血, 黄体酮试验: 利用孕激素在体内突然撤退能引起子宫出血的原理, 对月经过期可疑早孕妇女, 每日肌注黄体酮 20mg, 连用 3~5 天, 若停药后超过 7 天仍未出现阴道流血, 则早期妊娠的可能性很大。此题选 B. 早期妊娠。

13、初产妇, 30 岁, 孕 30 周, 胎方位为枕左前位, 听取胎心音的部位应在

- A、 脐下左侧
- B、 脐下右侧
- C、 脐上左侧
- D、 脐上右侧
- E、 脐周围

答案： A

解析：枕先露时，胎心音在脐下方右或左侧；臀先露时，胎心音在脐上方右或左侧；肩先露时，胎心音在脐部下方听得最清楚。此题选择答案 A。

14、正常足月妊娠时，羊水量约为

- A、 350ml
- B、 500ml
- C、 800ml
- D、 1000ml
- E、 250ml

答案： C

解析：正常足月妊娠羊水量约为 800ml。在妊娠的任何时期，若羊水量超过 2000ml，可诊断为羊水过多；若在妊娠晚期羊水量少于 300ml，可诊断为羊水过少。

15、B 超检查可见胎心搏动的孕周为

- A、 8 周末起
- B、 12 周末起
- C、 16 周末起
- D、 20 周末起
- E、 24 周末起

答案： A

解析：胎儿 8 周末时已初具人形，可以分辨出眼、耳、口、鼻，四肢已具雏形，超声显像可见早期心脏已形成且有搏动。

16、“黑加征”是指

- A、 子宫增大、变软
- B、 子宫呈后倾位
- C、 子宫峡部软，子宫和宫颈似不相连
- D、 宫颈呈紫蓝色
- E、 乳头及乳晕着色加深

答案： C

解析：“黑加征”是妊娠早期双合诊的特征性表现：子宫峡部软，子宫和宫颈似不相连。

17、骨盆的出口横径是指

- A、 髂棘间径
- B、 髂嵴间径
- C、 坐骨结节间径
- D、 坐骨棘间径
- E、 骶耻外径

答案： C

18、受精卵开始着床一般开始于受精的第

- A、 6~8 天
- B、 11~12 天
- C、 9~10 天
- D、 4~5 天
- E、 1~3 天

答案： A

19、产后子宫内膜完全修复的时间：

- A、 产后 6 周
- B、 产后 8 周
- C、 产后 10 周
- D、 产后 4 周左右
- E、 产后 30 天

答案： A

解析：子宫内膜残存的基底层再生新的功能层，约产后 3 周，除胎盘附着面外，子宫腔内膜基本完成修复，胎盘附着处的子宫内膜修复需 6 周。

20、某产妇，30 岁，阴道分娩，产后 10 天，正常的恶露为：

- A、 血性
- B、 浆液性
- C、 黏液性
- D、 白色恶露
- E、 无色恶露

答案： B

解析：产后血性恶露持续 1 周，浆液性恶露持续 1 周左右。

21、初乳是：

- A、 产后 3 天内分泌的乳汁
- B、 产后 5 天内分泌的乳汁
- C、 产后 7 天内分泌的乳汁
- D、 产后 7~14 天分泌的乳汁
- E、 产后 14 天以后分泌的乳汁

答案： C

解析： 产后 7 天内分泌的乳汁称初乳, 含脂肪及乳糖含量少, 易于消化吸收, 并有泻胎粪的作用。

22、产后子宫复位与平脐水平的时间为

- A、 产后 24 小时内
- B、 产后 2 天内
- C、 产后 3 天内
- D、 产后 5 天内
- E、 产后 1 周内

答案： A

23、某产妇, 于今日早晨经阴道顺产一女婴, 进展顺利。进行到产后第 4 天, 双乳房胀痛, 乳汁排流不畅, 最常见的原因是

- A、 进食少
- B、 卧床时间长, 活动少
- C、 未及早按摩. 热敷乳房
- D、 未给新生儿早吸吮. 多吸吮
- E、 乳头凹陷

答案： D

24、产妇产后 4~6 小时应排尿的原因是

- A、 利于伤口恢复
- B、 利于产妇舒适
- C、 利于产妇活动
- D、 利于子宫收缩
- E、 利于乳汁分泌

答案： D

25、产妇张某,分娩时会阴部撕伤,局部红、肿、热、痛,现给予湿热敷,操作时应特别注意

- A、 伤口周围涂凡士林
- B、 每 5min 更换敷布 1 次
- C、 床单上铺橡胶中单
- D、 执行无菌操作
- E、 水温调节适度

答案： D

26、进入第二产程的主要标志是

- A、 破膜
- B、 产妇用腹压
- C、 拨露
- D、 阴道口见先露
- E、 宫口开全

答案： E

解析：第二产程又称胎儿娩出期。从宫口开全到胎儿娩出,因此进入第二产程的主要标志是宫口开全。

27、第三产程处理错误的是

- A、 胎儿娩出后应立即挤压子宫,促使胎盘娩出
- B、 胎盘娩出后详细检查胎盘、胎膜是否完整
- C、 检查阴道、会阴有无裂伤
- D、 第三产程结束后,产妇在产房观察 2h
- E、 产后 2h 情况良好,护送到休养室

答案： A

解析：第三产程是指胎盘娩出期,处理者应该根据胎盘剥离的临床征象,判断胎盘的剥离情况,待胎盘剥离后再协助其完整娩出并认真检查其完整性。

28、分娩的主力是

- A、 产妇向下屏气力量
- B、 膈肌收缩力
- C、 腹肌收缩力

- D、 子宫收缩力
- E、 肛提肌收缩力

答案： D

解析：产力是将胎儿及其附属物由子宫腔排出的动力,包括子宫收缩力(简称宫缩)、腹肌和膈肌收缩力(统称腹压)以及肛提肌收缩力。其中子宫收缩力是最重要的,在整个分娩过程中起主导作用。

29、初产妇,入院分娩待产。检查:先露头已入盆,胎心正常,胎膜未破,宫颈口开1cm。护士为其采取的护理措施应不包括

- A、 每隔0.5~1小时听1次胎心
- B、 应在宫缩时测血压
- C、 鼓励适当进食
- D、 观察宫口扩张情况
- E、 定时排尿

答案： B

解析：宫缩时血压会升高,间歇期恢复原状,故不应在宫缩时测血压。

30、早产是指

- A、 妊娠满32周至不满40足周间分娩
- B、 妊娠满32周至不满36足周间分娩
- C、 妊娠满28周至不满36足周间分娩
- D、 妊娠满28周至不满40足周间分娩
- E、 妊娠满28周至不满37足周间分娩

答案： E

31、临产的主要标志是

- A、 规律且逐渐增强的宫缩,持续30秒或以上,间歇5-6分钟
- B、 产妇疼痛感加剧
- C、 宫口开全
- D、 胎儿心率加快
- E、 胎头下降至坐骨棘以下

答案： A

32、下列关于无应激试验正确的是:

- A、 能够观察宫缩后的胎心率变化

- B、一般监护 40min
- C、反应型是指监护时间内出现 2 次胎动伴 FHR 加速 ≥ 15 次/分, 持续时间 ≥ 15 秒
- D、无反应型是 20min 无胎心加速
- E、无应激试验结果无反应型说明胎儿情况正常

答案: C

33、正常的胎心率为()次/分钟

- A、60-100
- B、70-110
- C、110-160
- D、120-160
- E、100-160

答案: C

34、如用电子胎心监护测胎心率, 下列指标提示胎儿缺氧的是

- A、变异减速
- B、晚期减速
- C、胎心率的波动范围在 10~25 次/min
- D、早期减速
- E、变异的频率为 6 次/min

答案: B

35、胎心率一过性变化中, 加速是指宫缩时 FHR 增加 $\geq$ 多少次/分, 持续时间 $\geq$ 多少秒, 正确答案是:

- A、15, 15
- B、10, 10
- C、15, 10
- D、10, 15
- E、15. 20

答案: A

36、膝腱反射消失时, 不能使用的药物是

- A、杜冷丁(哌替啶)

- B、 硫酸镁
- C、 甘露醇
- D、 安定(地西洋)
- E、 肼苯哒嗪

答案： B

解析：硫酸镁的治疗浓度与中毒浓度相近。中毒现象首先为镁反射消失,随着血镁浓度的增加可出现全身肌张力减退及呼吸抑制,严重者心跳可突然停止。

37、25 岁已婚妇女,停经 60 天,阴道少量流血 2 天,伴轻度下腹痛,检查宫口闭,子宫如孕 2 个月大小,血常规化验正常,既往孕 2 个月流产 1 次,患者思想顾虑重。处理要点下列哪项不妥

- A、 以保胎防止流产为原则
- B、 卧床休息
- C、 减少不必要阴道检查
- D、 精神紧张者可给予镇静剂
- E、 尽早排出宫腔妊娠物

答案： E

解析：孕妇发现自己有先兆流产的迹象应尽快到医院检查,以明确病因和胎儿的状况,但要尽量减少不必要的阴道检查,以减少对子宫的刺激。如妊娠反应阳性,结合体温和 B 超检查认为适合保胎时,应在医生的指导下进行保胎治疗;如阴道出血量多于月经量,或其它诊断查明胎儿已死亡或难免流产,应尽早终止妊娠,防止出血及感染。所以 A. 处理原则不准确。

38、治疗妊高征时解痉的首选药物是

- A、 安定
- B、 吗啡
- C、 冬眠合剂
- D、 硫酸镁
- E、 肼苯达嗪

答案： D

解析：妊高征时首选硫酸镁进行解痉治疗。

39、患者女性,28 岁。已婚,未生育。现停经 50 天,有少量阴道流血,无早孕反应。妇科检查:宫口闭,软,双附件(-)。该病例最简单的辅助检查方法是

- A、 B 超
- B、 尿妊娠试验

- C、 阴道镜检查
- D、 阴道后穹隆穿刺
- E、 腹腔镜检查

答案： B

40、 严禁行肛门检查

- A、 前置胎盘
- B、 胎盘早剥
- C、 子宫破裂
- D、 胎膜早破
- E、 脐带脱垂

答案： A

解析： 怀疑前置胎盘的孕妇, 切忌肛查。

41、 下列哪项不是前置胎盘的临床表现

- A、 子宫软, 无压痛
- B、 胎位清楚
- C、 妊娠晚期反复阴道出血
- D、 阴道出血, 腹痛剧烈
- E、 出血多时陷入休克

答案： D

解析： 妊娠晚期或临产时发生无痛性反复出血, 是前置胎盘的主要症状

42、 II度羊水污染表现为

- A、 羊水呈浅绿色
- B、 羊水呈黄色
- C、 羊水呈黄绿色
- D、 羊水呈浑浊棕黄色
- E、 羊水呈浑浊黄绿色

答案： E

43、 胎盘早剥的处理原则是

- A、 减轻腹痛
- B、 减少出血

- C、抑制宫缩
- D、期待疗法,等待自然分娩
- E、纠正休克,及时终止妊娠

答案: E

44、某患者,因“胎膜早破”入院。检查:头先露,未入盆,其余正常,错误的护理措施是

- A、绝对卧床休息,禁灌肠
- B、休息时取半卧位
- C、严密观察胎心音
- D、严密观察流出羊水的性状
- E、指导孕妇自测胎动

答案: B

45、产后出血的定义是

- A、产程中阴道出血量超过 500ml
- B、在胎儿娩出后 24 小时内阴道出血量超过 500ml
- C、在胎儿娩出后 2 小时内阴道出血量超过 500ml
- D、在胎儿娩出后 3 小时内阴道出血量超过 500ml
- E、在胎儿娩出后 12 小时内阴道出血量超过 500ml

答案: B

解析: 胎儿娩出后 24 小时内出血量超过 500ml 者为产后出血。

46、患者女,30 岁,剖宫产后 35 天,以晚期产后出血入院,采取保守治疗,护理措施不正确的是

- A、密切观察生命体征
- B、密切观察阴道出血情况
- C、保持外阴清洁
- D、协助做相关检查
- E、取半坐卧位

答案: E

解析: 晚期产后出血的主要并发症为失血性休克及感染,因此,处理时要密切观察生命体征,保持外阴干燥等。

47、产后出血最常见的原因是:

- A、 胎盘滞留
- B、 软产道损伤
- C、 凝血机制障碍
- D、 子宫收缩乏力
- E、 心理精神问题

答案： D

48、下列哪项与子宫先兆破裂不符合：

- A、 导尿时有血尿
- B、 出现病理缩复环
- C、 子宫下段明显压痛
- D、 胎儿先露部回升,宫颈口回缩

答案： D

49、50、患者,女性,50岁。应用激素替代疗法5年,现阴道不规则流血20余天,时多时少,淋漓不尽。该患者最可能患

- A、 子宫内膜癌
- B、 输卵管癌
- C、 子宫内膜炎
- D、 子宫颈癌
- E、 功能失调性子宫出血

答案： E

50、告知患者激素替代疗法的禁忌证是

- A、 不明原因的子宫出血
- B、 骨质疏松
- C、 冠心病
- D、 子宫肌瘤切除
- E、 冠心病一级预防

答案： A

51、为确定功血患者为子宫内膜不规则脱落型,取子宫内膜行镜检的最适宜时间为

- A、 月经前期

- B、 月经来潮 5-6 天
- C、 月经期任何时间
- D、 排卵期前后
- E、 月经来潮 12 小时内

答案： B

52、宫颈癌的好发部位在

- A、 子宫峡部组织学内口
- B、 子宫峡部解剖学内口
- C、 宫颈管内
- D、 宫颈阴道部
- E、 宫颈外口移行带区

答案： E

53、子宫内膜癌最典型的临床症状为

- A、 接触性出血
- B、 月经量过多
- C、 不规则阴道流血
- D、 血性白带
- E、 绝经后阴道出血

答案： E

54、子宫内膜癌最典型的临床表现为

- A、 下腹及腰骶部疼痛
- B、 下腹部可触及包块
- C、 贫血、消瘦、恶病质
- D、 白带增多伴阴部痒
- E、 绝经后不规则阴道流血

答案： E

55、最常见的卵巢良性肿瘤是

- A、 浆液性囊腺瘤
- B、 黏液性囊腺瘤

- C、 成熟畸胎瘤
- D、 颗粒细胞瘤
- E、 卵泡膜细胞瘤

答案： C

56、某患者宫内节育器放置术后出院, 护士为其做出院健康指导, 下列表述说明护士需要进一步讲解的是

- A、 不同类型的宫内节育器按规定时间, 到期即应取出或者更换
- B、 1 周内禁止性生活
- C、 术后若出现血多、腹痛症状应及时就医
- D、 于术后 3 个月、6 个月、1 年各复查一次
- E、 1 周内避免重体力劳动

答案： B

解析：术后休息 3 天, 1 周内避免重体力劳动; 禁性生活及盆浴 2 周, 保持外阴清洁; 3 个月内月经或大便时注意有无节育器脱落。

57、产后 2 个月的哺乳期妇女, 其避孕方法应首选

- A、 闭经可不避孕
- B、 口服避孕药
- C、 阴茎套
- D、 安全期避孕
- E、 宫内节育器

答案： C

58、关于母乳喂养下列哪项错误

- A、 实行母婴同室
- B、 母乳中含有多种抗体
- C、 给婴儿吸橡皮奶头做安慰物
- D、 帮助母亲在产后半小时开奶
- E、 鼓励按需哺乳

答案： C

解析：不能给婴儿吸橡皮奶头做安慰物

59、产后血性恶露一般持续

- A、 9~10 天

B、 7~8 天

C、 5~6 天

D、 3~4 天

E、 1~2 天

答案： D

60、组织学内口处是宫颈癌的好发部位

答案： 错误

61、受精卵着床约发生在受精后的 6-7 日

答案： 正确

62、妊娠 28-30 周心搏出量达到高峰

答案： 错误

63、产力包括子宫收缩力、腹壁肌及膈肌收缩力和肛提肌收缩力。

答案： 正确

64、第三产程是胎盘娩出期,越需要 5-15 分钟,不应超过 30 分钟。

答案： 正确

65、妊娠合并心脏病患者为预防心力衰竭,应严格限制食盐量在 3g 以下

答案： 错误

66、妊娠合并糖尿病的 75gOGTT 诊断标准是:空腹及服糖后 1、2 小时的血糖值分别为 5.1 mmol/L、10.0 mmol/L、8.5mmol/L。任何一点血糖值达到或超过上述标准即可诊断 GDM

答案： 正确

67、产后出血最常见的原因是胎盘滞留或植入

答案： 错误

68、排卵障碍性异常子宫出血,在使用雌激素时,药物减量必须按医嘱规定在血止后才能开始,每 3 日减量一次,每次减量不超过原剂量的 1/3,直至维持量

答案： 正确

69、宫颈刮片是筛查早期宫颈癌的重要办法。

答案： 正确

70、组成骨盆的是

- A、 骶骨、尾骨及 2 块髌骨
- B、 骶骨、尾骨及坐骨
- C、 髌骨、骶骨及坐骨
- D、 髌骨、坐骨及耻骨
- E、 髌骨、骶骨及尾骨

答案： A

71、孕激素生理功能, 正确的是

- A、 使子宫内膜转化为分泌期内膜
- B、 使子宫颈黏液增多变稀
- C、 使阴道上皮细胞增生角化
- D、 使输卵管蠕动增强
- E、 大剂量可抑制乳汁分泌

答案： A

72、女性, 25 岁, 月经周期为 30 天, 上月月经是 4 月 18 日, 护士为其计算的排卵日期约在 5 月

- A、 1 日
- B、 4 日
- C、 8 日
- D、 12 日
- E、 14 日

答案： B

73、直接维持子宫前倾位置的韧带是

- A、 骶结节韧带
- B、 阔韧带
- C、 主韧带
- D、 骶棘韧带
- E、 圆韧带

答案： E

74、属横产式胎位的是

- A、 头先露
- B、 面先露
- C、 枕先露
- D、 臀先露
- E、 肩先露

答案： E

75、妊娠期正常孕妇血液循环系统的变化,正确的为

- A、 血沉稍降低
- B、 血液相对浓缩
- C、 血液处于低凝状态
- D、 收缩压无明显变化
- E、 后期心率增加约 20 次/分

答案： D

76、王某, 28 岁, 未产妇, 述说平素月经规律, 28 天一次, 每次持续 3~4 天。其末次月经是 2 月 11 日, 距今已有 8 周, 现病人感觉疲乏, 乳房触痛明显。化验报告提示尿妊娠反应(+), 此化验的原理是查体内的

- A、 催产素水平
- B、 黄体酮水平
- C、 雌激素水平
- D、 绒毛膜促性腺激素水平
- E、 黄体生成素水平

答案： D

77、26 岁初产妇, 足月临产, 进入第二产程, 宫缩规律有力。宫缩时因疼痛加剧, 产妇烦躁不安, 大声喊叫, 要求行剖宫产尽快分娩。此时, 产妇主要的心理特点是

- A、 焦虑
- B、 内省
- C、 依赖
- D、 悲伤
- E、 抑郁

答案： A

78、孕妇, 27 岁。末次月经 2017 年 3 月 14 日, 该孕妇的预产期是

- A、 2017 年 11 月 21 日
- B、 2017 年 12 月 21 日
- C、 2017 年 10 月 21 日
- D、 2017 年 11 月 28 日
- E、 2017 年 12 月 28 日

答案： B

79、汪女士, 妊娠 28 周, 产前检查均正常, 咨询监护胎儿情况最简单的方法, 应指导其采用(1. 5)

- A、 胎心听诊
- B、 自我胎动计数
- C、 测宫高、腹围
- D、 B 超检查
- E、 电子胎心监护

答案： B

80、妇女, 27 岁, 停经 60 天, 恶心、呕吐一周, 每日呕吐 3~4 次, 进食量明显减少, 尿酮体阴性, 正确的护理措施是

- A、 日服镇静剂
- B、 高蛋白饮食
- C、 鼓励少量多餐
- D、 绝对卧床休息
- E、 输血

答案： C

81、女性, 28 岁, 已婚。停经 50 天, 恶心、呕吐 1 周来院就诊。妇检: 子宫较正常稍大, 软, 宫颈着色。首选的检查是

- A、 黄体酮试验
- B、 尿妊娠试验
- C、 基础体温测定
- D、 阴道分泌物检查

E、 血液 HCG 测定

答案： B

82、下列哪项不是新生儿 Apgar 评分标准：

A、 体温

B、 心率

C、 呼吸

D、 肌张力

E、 皮肤颜色

答案： A

83、以下不属于产力的是

A、 子宫收缩力

B、 腹肌收缩力

C、 膈肌收缩力

D、 坐骨海绵体肌收缩力

E、 肛提肌收缩力

答案： D

84、患者女性, 24 岁。初孕妇。妊娠 38 周, 在临产过程中, 出现烦躁不安, 疼痛难忍, 下腹部拒按, 排尿困难。考虑的诊断是

A、 妊娠合并急性阑尾炎

B、 先兆子宫破裂

C、 前置胎盘

D、 胎盘早剥

E、 先兆早产

答案： B

85、在正常分娩中, 哪项动作可以使胎头矢状缝转变为与中骨盆及骨盆出口前后径一致

A、 外旋转

B、 内旋转

C、 仰伸

D、 俯屈

E、 衔接

答案： B

86、胎头宫缩时暴露于阴道口,当宫缩间歇时又缩回阴道内,称为

A、 胎头着冠

B、 胎头拨露

C、 胎头俯屈

D、 胎头仰伸

E、 胎头下降

F、 :B

G、 程度:中

H、 解析:胎头于宫缩时暴露于阴道口,当宫缩间歇时又缩回阴道内,称为胎头拨露。

I、 宫缩间歇时,胎头也不再回缩,称为胎头着冠。

答案： B

87、产后子宫内膜完全修复的时间:

A、 产后 6 周

B、 产后 8 周

C、 产后 10 周

D、 产后 4 周左右

E、 产后 30 天

答案： A

88、关于母乳喂养下列哪项错误

A、 实行母婴同室

B、 母乳中含有多种抗体

C、 给婴儿吸橡皮奶头做安慰物

D、 帮助母亲在产后半小时开奶

E、 鼓励按需哺乳

答案： C

89、产后护理错误的是：

- A、 情况正常者 24h 后下床活动
- B、 保证充分休息和睡眠
- C、 饮食富于营养,注意多吃蔬菜
- D、 衣着温暖适宜
- E、 产后 10h 内排尿

答案： E

90、一产后 20 天妇女,恶露为鲜红色、量多、有腥臭味,应采取何种措施最好：

- A、 宫缩剂使用,必要时用抗生素
- B、 止血药物应用
- C、 输液、供给营养
- D、 保证睡眠、适当活动
- E、 正常生理现象,不用干预

答案： A

91、初产妇,29 岁。自然分娩后第 2 天。诉下腹部阵痛。检查:子宫硬,宫底在脐下 2 横指,血性恶露,量小。护士对产妇的指导正确的是

- A、 产时应用缩宫素所致
- B、 产后宫缩痛
- C、 不可应用镇痛药物
- D、 减少新生儿吸吮,以缓解疼痛
- E、 通常 1 周后消失

答案： B

92、产褥期护理措施,下述哪项不对

- A、 测体温.脉搏.呼吸,每日 2 次
- B、 产后适宜多取蹲位
- C、 产后 24 小时鼓励产妇下床活动
- D、 饮食应富有营养
- E、 产妇应多吃蔬菜水果

答案： B

93、产妇产后 4 小时应排尿的原因是

- A、 利于伤口恢复
- B、 利于产妇舒适
- C、 利于产妇活动
- D、 利于子宫收缩
- E、 利于乳汁分泌

答案： D

94、下列关于缩宫素激惹试验说法错误的是：

- A、 试验宫缩要求：宫缩 ≥ 3 次/10 分钟，每次持续 ≥ 40 秒
- B、 可通过刺激乳头或静脉滴注缩宫素的方法诱导宫缩
- C、 判读主要取决于是否出现晚期减速
- D、 出现晚期减速说明胎儿宫内储备能力好
- E、 需诱导宫缩

答案： D

95、正常的胎心率为()次/分钟

- A、 60-100
- B、 70-110
- C、 110-160
- D、 120-160
- E、 100-160

答案： C

96、如用电子胎心监护测胎心率, 下列指标提示胎儿缺氧的是

- A、 变异减速
- B、 晚期减速
- C、 胎心率的波动范围在 10~25 次/min
- D、 早期减速
- E、 变异的频率为 6 次/min

答案： B

97、正常胎心率基线变异幅度为是:1

- A、 1-15 次/分
- B、 6-20 次/分
- C、 6-25 次/分
- D、 15-25 次/分
- E、 10-20 次/分

答案： C

98、 严禁行肛门检查的是

- A、 前置胎盘
- B、 胎盘早剥
- C、 子宫破裂
- D、 胎膜早破
- E、 脐带脱垂

答案： A

99、 羊水过多指妊娠期羊水量超过

- A、 600ml
- B、 800ml
- C、 1000ml
- D、 1500ml
- E、 2000ml

答案： E

100、 关于胎盘早剥的病理正确的是：

- A、 子宫下段伸展与胎盘错位分离
- B、 底蜕膜出血并形成血肿, 使胎盘从附着处分离
- C、 胎儿缺血缺氧
- D、 子宫小血管痉挛

答案： B

101、 前置胎盘阴道流血的特点哪项错误

- A、 常发生在妊娠晚期
- B、 无痛性阴道流血

- C、 胎盘位置越低,出血越多
- D、 贫血程度与阴道流血量成正比
- E、 出血发生的早晚与前置胎盘的类型无关

答案: E

102、羊水过多的描述错误的是

- A、 羊水量超过 2000ml
- B、 最常见的原因是中枢神经系统和上消化道畸形
- C、 慢性羊水过多者因病程长,所以症状明显
- D、 一旦破膜应立即平卧,同时抬高臀部
- E、 放羊水后,腹部放置砂袋

答案: C

103、孕妇,妊娠 28 周,因意外碰撞出现持续性腹痛,查体:子宫硬如板状,有压痛,子宫比妊娠周数大,阴道无流血,胎心、胎动消失。诊断为重型胎盘早剥。通过以上病历分析,该孕妇最易出现的并发症是

- A、 心衰
- B、 呼吸窘迫综合征
- C、 羊水过少
- D、 弥漫性血管内凝血
- E、 胎膜早破

答案: D

104、李某,初产妇,孕 1 产 0,妊娠 34 周,BP170/120mmHg,尿蛋白(+++),水肿 II 度,自觉头晕、眼花,诊断为哪种妊高征

- A、 轻度
- B、 中度
- C、 妊娠高血压
- D、 先兆子痫
- E、 子痫

答案: D

105、膝腱反射消失时,不能使用的药物是

- A、 杜冷丁(哌替啶)

- B、 硫酸镁
- C、 甘露醇
- D、 安定(地西洋)
- E、 肼苯哒嗪

答案： B

106、异位妊娠常发生的部位是

- A、 卵巢
- B、 宫颈
- C、 腹腔
- D、 输卵管
- E、 子宫直肠陷凹

答案： D

107、某孕妇,孕1产0,孕37周,诊断“中度妊娠高血压综合症”住院治疗,自诉因担心药物影响胎儿发育成长,不愿接受药物治疗,但又怕不服药会使病情加重,威胁胎儿的安全,心情矛盾。在护理中,首先应是

- A、 测量血压 2~4 次/日
- B、 安静地休息
- C、 观察症状
- D、 心理护理
- E、 观察并发症

答案： D

108、妊娠合并糖尿病对胎儿的不良影响,不包括

- A、 早产儿
- B、 胎儿畸形
- C、 溶血症
- D、 巨大儿
- E、 胎儿生长受限

答案： C

109、患者女性,为育龄妇女,心功能 I~II 级,无心力衰竭且无其他并发症。对她的妊娠建议是

- A、 可以
- B、 不可以
- C、 密切监护下可以
- D、 绝对不可以
- E、 终生不孕

答案： C

110、某产妇,妊娠 38 周,产前合并有轻度妊娠期高血压疾病,产后阴道持续出血,胎儿娩出后 24 小时出血量达 600ml,检查子宫软,按摩后子宫变硬,阴道流血减少,该产妇诊断为产后出血。造成该产妇产后出血的最可能原因是

- A、 子宫收缩乏力
- B、 胎盘残留
- C、 软产道裂伤
- D、 凝血功能障碍
- E、 胎膜残留

答案： A

111、产后出血的定义是

- A、 产程中阴道出血量超过 500ml
- B、 在胎儿娩出后 24 小时内阴道出血量超过 500ml
- C、 在胎儿娩出后 2 小时内阴道出血量超过 500ml
- D、 在胎儿娩出后 3 小时内阴道出血量超过 500ml
- E、 在胎儿娩出后 12 小时内阴道出血量超过 500ml

答案： B

112、某患者,第一胎,足月顺产,当胎儿娩出后,阴道出血约为 500ml,血液呈鲜红色,很快凝成血块,此时胎盘尚未娩出,根据上述情况,考虑出血原因的最大可能是

- A、 宫缩乏力
- B、 软产道损伤
- C、 胎盘滞留
- D、 胎盘残留
- E、 凝血功能障碍

答案： B

113、初产妇 30 岁,妊娠 38 周,侧切自然分娩一健康男婴,胎盘正常娩出。产后 1 小时发现产妇面色苍白,出冷汗,阴道流血量较多,主诉头晕、心慌和口渴。血压 90/50mmHg,脉搏 120 次/分,既往血小板减少症,无高血压及低血压,无贫血史。最有可能的诊断是

- A、 产后出血
- B、 胎膜早破
- C、 贫血
- D、 先兆子宫破裂
- E、 羊水栓塞

答案： A

114、产后出血病人的处理原则是

- A、 止血、扩容、抗休克、抗感染
- B、 输血、抗凝、抗感染、抗休克
- C、 纠酸、抗凝、抗感染、抗休克
- D、 切除子宫、扩容、抗感染
- E、 严密观察病情变化,不急于处理

答案： A

115、患者女性,58 岁,因血性白带,外阴瘙痒,灼热感及尿频、尿痛、尿失禁等就诊。医生诊断为:老年性阴道炎。护士指导坐浴正确的是

- A、 冷水坐浴
- B、 碱性水坐浴
- C、 烫水坐浴
- D、 酸性温水坐浴
- E、 盐水坐浴

答案： D

116、患者女性,28 岁,医生诊断为细菌性阴道病(BV),护士在指导患者时应纠正患者对该病不正确的认识是

- A、 细菌性阴道病的自然病史表现为自愈性或复发性

- B、 细菌性阴道病是由于阴道内乳酸杆菌减少, 其他细菌大量繁殖所引起的混合感染
- C、 细菌性阴道病患者的性伴侣都不需要治疗
- D、 将阴道分泌物涂抹在玻片上, 滴入 1~2 滴 KOH 产生烂鱼样腥臭味即为阳性
- E、 患有细菌性阴道病的孕妇无论有无症状都需要进行治疗

答案: C

117、适宜碱性溶液冲洗阴道的患者是

- A、 外阴阴道假丝酵母菌病
- B、 滴虫阴道炎
- C、 老年性阴道炎
- D、 前庭大腺炎
- E、 慢性宫颈炎

答案: A

118、滴虫阴道炎的治愈标准是

- A、 连续 3 次月经后检查滴虫阴性
- B、 连续 3 次月经前检查未找到滴虫
- C、 全身及局部用药 3 个疗程可治愈
- D、 白带悬滴法检查滴虫转阴性
- E、 连续 3 次月经前检查临床症状消失

答案: A

119、葡萄胎清宫术后 4 个月, hCG 持续阳性, 咯血, 首先考虑为

- A、 侵蚀性葡萄胎
- B、 葡萄胎
- C、 绒毛膜癌
- D、 不全流产
- E、 难免流产

答案: A

120、绒癌常见的转移部位是

- A、 胃

- B、 肺
- C、 肝
- D、 脑
- E、 阴道

答案： B

121、刘女士,46岁,近半年月经紊乱,周期超过40天,有阵发性潮热现象,近期情绪低落,不能自我控制,有可能是

- A、 月经紊乱
- B、 继发性闭经
- C、 围绝经期综合征
- D、 黄体发育不健
- E、 精神因素导致月经周期延长

答案： C

122、患者女性,18岁,高三学生,月经来潮3年,有痛经史,今日月经第一天,下腹部疼痛,坠胀伴腰痛就诊,医生诊断为:原发性痛经。该疾病的护理为

- A、 遵医嘱给予止痛药、镇静剂;腹部热敷或进食冷饮
- B、 遵医嘱给予止痛药、镇静剂;腹部冷敷或进食热饮
- C、 遵医嘱给予止痛药、镇静剂;腹部热敷或进食热饮
- D、 遵医嘱给予止痛药、镇静剂;腹部热敷或进普通食
- E、 遵医嘱给予止痛药、镇静剂;腹部冷敷或进食冷饮

答案： C

123、35岁已婚妇女,近年来,月经周期30~32天,月经持续10~15天,经量时多时少。基础体温呈双相,为明确诊断需行刮宫术,时间应在

- A、 月经来潮前1周
- B、 月经来潮12小时内
- C、 月经第3天
- D、 月经第5天
- E、 月经来潮24小时内

答案： D

124、一子宫肌瘤患者,行子宫全切术后,护士为其进行出院指导,告知患者术后阴道残端肠线吸收,可致阴道少量出血,大约在术后

- A、 28~29 天出现
- B、 21~22 天出现
- C、 14~15 天出现
- D、 3~4 天出现
- E、 7~8 天出现

答案: E

125、一位卵巢癌患者,今日手术,术后需保留尿管,护士正确的护理应为

- A、 2 天擦洗尿道口及尿管 1 次
- B、 每天擦洗尿道口及尿管 1 次
- C、 每天擦洗尿道口及尿管 2 次
- D、 每天擦洗尿道口及尿管 3 次
- E、 每天擦洗尿道口及尿管 4 次

答案: C

126、宫颈癌普查的常用方法是

- A、 宫颈刮片细胞学检查
- B、 碘试验
- C、 宫颈和宫颈管活组织检查
- D、 阴道镜检查
- E、 B 型超声

答案: A

127、最常见的卵巢良性肿瘤是

- A、 浆液性囊腺瘤
- B、 黏液性囊腺瘤
- C、 成熟畸胎瘤
- D、 颗粒细胞瘤
- E、 卵泡膜细胞瘤

答案: C

128、宫颈刮片细胞学检查, 报告为巴氏Ⅱ级, 考虑为

- A、 可疑癌
- B、 正常
- C、 癌症
- D、 高度可疑癌
- E、 炎症

答案： E

129、子宫内膜癌首选的治疗方法是

- A、 放射治疗
- B、 化疗
- C、 免疫治疗
- D、 内分泌治疗
- E、 手术治疗

答案： E

130、宫骶韧带是维持子宫在盆腔正中位置的韧带。

答案： 错误

131、耻骨联合上缘、髂耻缘、骶岬上缘的连线是真假骨盆的分界线。

答案： 正确

132、妊娠 32-34 周心搏出量达到高峰。

答案： 正确

133、产力包括子宫收缩力、腹壁肌及膈肌收缩力和肛提肌收缩力。

答案： 正确

134、第二产程是胎儿娩出期, 初产妇约需要 1-2 小时。

答案： 正确

135、妊娠合并心脏病患者, 不用限制食盐摄入量(1.0)

答案： 错误

136、妊娠合并糖尿病的 75gOGTT 诊断标准是:空腹及服糖后 1、2 小时的血糖值分别为 5.3mmol/L、11.1mmol/L、8.5mmol/L。任何一点血糖值达到或超过上述标准即可诊断 GDM。

答案: 错误

137、产后出血最常见的原因是宫缩乏力。

答案: 正确

138、高胆固醇饮食是卵巢肿瘤发病的高危因素。

答案: 正确

139、宫内节育器放置术后应避免重体力劳动 1 周。

答案: 正确

140、输卵管由内向外依次为:

- A、 峡部 间质部 壶腹部 伞部
- B、 峡部 壶腹部 间质部 伞部
- C、 间质部 峡部 壶腹部 伞部
- D、 间质部 峡部 伞部 壶腹部
- E、 伞部 壶腹部 峡部 间质部

答案: C

141、固定子宫颈于正常位置的子宫韧带是:

- A、 宫骶韧带
- B、 主韧带
- C、 阔韧带
- D、 圆韧带
- E、 骶结节韧带

答案: B

142、哪项是雌激素的生理功能

- A、 使子宫肌肉松弛
- B、 使子宫内膜由增生期变为分泌期
- C、 降低子宫对缩宫素的敏感性
- D、 使排卵后体温升高

E、使阴道上皮增生、角化、成熟

答案： E

143、我国采用围生期,其概念可以界定为

A、自胚胎形成至产后 1 周

B、自孕满 20 周至产后 1 周

C、自孕满 20 周至产后 4 周

D、自孕满 28 周至产后 1 周

E、自孕满 28 周至产后 4 周

答案： D

144、胎盘由下列哪些组织构成

A、平滑绒毛膜、包蜕膜、羊膜

B、平滑绒毛膜、底蜕膜、真蜕膜

C、叶状绒毛膜、包蜕膜、真蜕膜

D、叶状绒毛膜、底蜕膜、羊膜

E、叶状绒毛膜、底蜕膜、真蜕膜

答案： D

145、孕妇, 34 岁, 因平卧于床上看书, 感觉心悸、出汗, 正确的护理措施是

A、改为左侧卧位

B、给予口服升压药

C、立即坐起

D、改为右侧卧位

E、起身进行户外活动

答案： A

146、孕妇, 26 岁, 孕 39 周, 上午家务劳动时突感胎动频繁, 至傍晚胎动渐减弱、消失, 急诊入院, 听诊胎心音 90 次/分, 下列护理措施不妥的是

A、左侧卧位, 间断吸氧

B、行胎心监护

C、嘱孕妇增加营养和休息即可, 继续观察病情

D、协助做好手术产的准备

E、做好新生儿的抢救和复苏准备

答案： C

147、孕妇, 27 岁。末次月经 2017 年 3 月 14 日, 该孕妇的预产期是

- A、 2017 年 11 月 21 日
- B、 2017 年 12 月 21 日
- C、 2017 年 10 月 21 日
- D、 2017 年 11 月 28 日
- E、 2017 年 12 月 28 日

答案： B

148、汪女士, 妊娠 28 周, 产前检查均正常, 咨询监护胎儿情况最简单的方法, 应指导其采用

- A、 胎心听诊
- B、 自我胎动计数
- C、 测宫高、腹围
- D、 B 超检查
- E、 电子胎心监护

答案： B

149、妊娠合并心脏病孕妇, 产程处理正确的是

- A、 第一产程不易发生心衰, 可一般护理
- B、 第二产程一般不予手术助产
- C、 胎儿娩出后立即给产妇注射麦角新碱
- D、 胎儿娩出后立即给产妇注射吗啡
- E、 胎儿娩出后应立即娩出胎盘

答案： D

150、张女士, 28 岁, 第一胎, 孕足月, 今晨产钳助娩一男婴, 体重 3.5kg。出生后 Apgar 评分 7 分, 该新生儿护理措施中不妥的是:

- A、 严密观察面色、呼吸、哭声
- B、 补充营养、必要时静脉补液
- C、 保持清洁, 每天淋浴
- D、 常规使用维生素 K, 肌注
- E、 3 天后情况正常可以喂奶

答案： C

151、下列哪项不是新生儿 Apgar 评分标准：

- A、 体温
- B、 心率
- C、 呼吸
- D、 肌张力
- E、 皮肤颜色

答案： A

152、患者女性, 宫内妊娠 38 周, G1P0, 宫缩强, 胎儿在宫缩期迅速娩出, 婴儿体重 4100g, 总产程为 3 小时 40 分钟。产后有较多的持续性阴道流血, 色鲜红, 能凝固, 出血原因最可能是

- A、 胎盘剥离不全
- B、 胎盘植入
- C、 产后宫缩乏力
- D、 凝血功能障碍
- E、 软产道损伤

答案： E

153、某孕妇, G4P1, 孕 40 周, 人工流产 3 次, 产程进展顺利, 胎儿娩出后 30 分钟, 胎盘未娩出, 亦无剥离征象, 阴道无出血, 最可能的原因是

- A、 胎盘剥离后滞留
- B、 胎盘剥离不全
- C、 胎盘部分性植入
- D、 胎盘完全粘连
- E、 胎盘嵌顿

答案： D

154、患者, 女性, 24 岁。初孕妇。妊娠 38 周, 在临产过程中, 出现烦躁不安, 疼痛难忍, 下腹部拒按, 排尿困难。考虑的诊断是

- A、 妊娠合并急性阑尾炎
- B、 先兆子宫破裂
- C、 前置胎盘
- D、 胎盘早剥

E、 先兆早产

答案： B

155、胎头的最大横径是

A、 枕下前凶径

B、 枕额径

C、 枕颞径

D、 双顶径

E、 双颞径

答案： D

156、母乳指导中哪项不妥

A、 宣传母乳喂养的好处

B、 告诉产妇开奶越早越好

C、 待下奶后立即哺乳

D、 吸吮乳头可使生乳素增加

E、 吸吮有助于乳汁分泌

答案： C

157、某产妇, 30 岁, 阴道分娩, 产后 10 天, 正常的恶露为:

A、 血性

B、 浆液性

C、 黏液性

D、 白色恶露

E、 无色恶露

答案： B

158、产后子宫内膜完全修复的时间:

A、 产后 6 周

B、 产后 8 周

C、 产后 10 周

D、 产后 4 周左右

E、 产后 30 天

答案： A

159、产后护理错误的是：

- A、 情况正常者 24h 后下床活动
- B、 保证充分休息和睡眠
- C、 饮食富于营养,注意多吃蔬菜
- D、 衣着温暖适宜
- E、 产后 10h 内排尿

答案： E

160、患者,女,产后 8 小时产妇还不能自行排尿,宫底下方扪及囊性包块,说明有尿潴留。下列处理错误的是

- A、 让产妇听流水声
- B、 帮助其下床排尿
- C、 按摩膀胱或针刺三阴交、气海、关元等穴位
- D、 用温水冲洗会阴部
- E、 首先导尿

答案： E

161、某产妇,足月产后 3 天,出现下腹痛,体温不高,恶露多,有臭味,子宫底位于脐上 1 指,子宫体软。以下护理措施中,错误的是

- A、 做好会阴护理
- B、 半卧位或抬高床头
- C、 监测体温变化
- D、 做好心理支持
- E、 红外线照射会阴部每日 3 次,每次 1 小时

答案： E

162、女,26 岁,产后 3d,测腋下体温 37.6℃。检查:子宫收缩好,无压痛,会阴切口愈合好,恶露无臭味。双乳房增大,发红,可触及硬结。发热原因最可能是

- A、 会阴切口感染
- B、 乳汁淤积
- C、 产褥感染
- D、 产褥热

E、 上呼吸道感染

答案： B

163、某产妇,于今日早晨经阴道顺产一女婴,进展顺利。该产妇在产后4天,有下列主诉,哪项提示为异常产褥现象

A、 出汗多

B、 阴道分泌物颜色淡红

C、 乳房胀痛

D、 腹部疼痛,伴呕吐

E、 低热

答案： D

164、下列关于无应激试验正确的是:

A、 能够观察宫缩后的胎心率变化

B、 一般监护 40min

C、 反应型是指监护时间内出现 2 次胎动伴 FHR 加速 ≥ 15 次/分,持续时间 ≥ 15 秒

D、 无反应型是 20min 无胎心加速

E、 无应激试验结果无反应型说明胎儿情况正常

答案： C

165、某孕妇妊娠 38 周,为判断其胎盘功能,应

A、 测定羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值

B、 测定血或尿中雌三醇值

C、 测定血中 hCG 值

D、 测定羊水中肌酐值

E、 测定羊水中脂肪细胞值

答案： B

166、宫缩压力试验的目的是

A、 察胎心基线的变异

B、 观察宫缩对胎心率的影响

C、 观察子宫对胎动的反应

D、 观察胎动后胎心增速的情况

E、 观察子宫对催产素的敏感性

答案： B

167、羊水过多指妊娠期羊水量超过

A、 600ml

B、 800ml

C、 1000ml

D、 1500ml

E、 2000ml

答案： E

168、严禁行肛门检查

A、 前置胎盘

B、 胎盘早剥

C、 子宫破裂

D、 胎膜早破

E、 脐带脱垂

答案： A

169、产妇, 35 岁, 孕 1 产 0, 孕 42 周, 诊断过期产妊娠收入院, 给予缩宫素引产, 有规则宫缩后 4 小时, 胎心电子监护提示“胎儿窘迫”。当产妇提出不愿吸氧时, 责任护士应耐心向其解释吸氧的目的是:

A、 镇静

B、 改善产妇的心率

C、 给胎儿更多的氧气

D、 改善手术时的耐受度

E、 减少出血

答案： C

170、孔女士, 28 岁, 妊娠 35 周, 超声检查为完全性前置胎盘, 无宫缩, 宫口未开, 胎心率 140 次/min, 血压 110/80mmHg, 应立即采取的措施是

A、 人工破膜

B、 阴道检查

C、 输血

- D、 剖宫产
- E、 卧床休息

答案： E

171、初孕妇, 27 岁, 妊娠 37 周, 阴道无痛性反复阴道流血 1 天, 流血量超过 500ml, 检查枕左前位, 胎心 120 次/分, 无规律宫缩。本例应诊断

- A、 妊娠高血压综合征
- B、 前置胎盘
- C、 胎盘早期剥离
- D、 羊水栓塞
- E、 凝血功能障碍

答案： B

172、孕妇, 30 岁。妊娠 37+5 周, 因突发持续性腹痛, 伴阴道流血就诊。腹部检查: 子宫硬如板状, 有压痛。该孕妇最可能是

- A、 胎盘早剥
- B、 羊水栓塞
- C、 前置胎盘
- D、 先兆流产
- E、 流产

答案： A

173、孕妇, 妊娠 28 周, 因意外碰撞出现持续性腹痛, 查体: 子宫硬如板状, 有压痛, 子宫比妊娠周数大, 阴道无流血, 胎心、胎动消失。诊断为重型胎盘早剥。通过以上病历分析, 该孕妇最易出现的并发症是

- A、 心衰
- B、 呼吸窘迫综合征
- C、 羊水过少
- D、 弥漫性血管内凝血
- E、 胎膜早破

答案： D

174、女性, 妊娠 34 周, 以先兆子痫入院。今晨突发腹痛, 阴道有少量出血, 子宫强硬, 有压痛, 胎位触摸不清。胎心音未闻及, 孕妇生命体征尚可。该患者目前的初步诊断是

- A、前置胎盘
- B、胎盘早剥
- C、先兆早产
- D、卵巢囊肿扭转
- E、先兆子宫破裂

答案： B

175、患者女, 25 岁, 妊娠 35 周并发妊娠高血压疾病, 2 小时前突然发生持续性腹痛伴阴道少量流血。血压下降, 首先考虑为

- A、先兆早产
- B、先兆临产
- C、先兆子宫破裂
- D、前置胎盘
- E、胎盘早期剥离

答案： E

176、确诊前置胎盘的方法是

- A、阴道检查
- B、肛门检查
- C、B 超检查
- D、放射线检查
- E、化验检查

答案： C

177、初产妇, 28 岁。足月妊娠临产, 2 小时前肛查宫口开 4cm, 现肛查宫口仍开 4cm, 检查: 宫缩 7~8 分钟一次, 持续时间 30 秒, 胎膜未破, 其余无异常。根据患者出现的问题, 正确的处理措施是

- A、静脉滴注催产素
- B、人工破膜
- C、会阴侧切
- D、给予镇静剂
- E、产钳助产

答案： B

178、一产妇足月妊娠, 胎儿估计 4000g, 临产后 20 小时, 胎头为坐骨棘下 1cm, 宫口开全、尾骨前翘, 耻骨弓角度低出口横径加后矢状径<15cm。应采取下列哪项处理

- A、 再观察
- B、 胎心监护
- C、 立即剖宫产
- D、 心理护理
- E、 催产素引产

答案： C

179、产妇, 27 岁。因子宫收缩过强, 出现急产。对于其新生儿正确的护理措施是

- A、 早吸吮
- B、 出生后半小时内喂葡萄糖水
- C、 按医嘱给维生素 K1 肌注
- D、 与母亲皮肤接触
- E、 新生儿抚触

答案： C

180、胎儿娩出后胎盘多长时间尚未娩出者称为胎盘滞留

- A、 15min
- B、 20min
- C、 30min
- D、 1min
- E、 2min

答案： C

181、孕妇, 30 岁, 妊娠 38 周, 第一胎。规律性腹痛 3 小时入院待产。胎方位为单臀位, 估计胎儿重 3000g, 骨盆外测量正常。对该孕妇的处理原则, 错误的是

- A、 胎方位为臀位的初产妇一律行剖宫产
- B、 可考虑阴道助产
- C、 注意后出胎头的娩出
- D、 随时做好手术准备
- E、 阴道分娩时注意严密监测胎儿情况

答案： A

182、患者,女,35岁,已婚。主诉近日白带增多,外阴瘙痒伴灼痛1周。妇科检查:阴道内多量灰白泡沫状分泌物,阴道壁散在红斑点。有助于诊断的检查是

- A、 阴道分泌物涂片检查
- B、 宫颈刮片
- C、 盆腔B超
- D、 诊断性刮宫
- E、 阴道镜检查

答案： A

183、患者女性,38岁,外阴瘙痒,灼痛,白带呈豆渣样,医生诊断为外阴阴道念珠菌病。护士指导患者时应纠正患者认为与此病发病无关及不正确的认识是

- A、 糖尿病
- B、 长期应用抗生素
- C、 阴道乳酸杆菌数量的减少
- D、 长期使用避孕套避孕
- E、 口腔、肠道、阴道内的念珠菌交叉感染

答案： D

184、患者女24岁,入院诊断为外阴炎,医嘱1:5000高锰酸钾溶液坐浴治疗,治疗外阴炎高锰酸钾最主要的作用是

- A、 杀灭细菌
- B、 减缓瘙痒
- C、 增加阴道碱度
- D、 抑制菌群紊乱
- E、 清洁外阴作用

答案： A

185、外阴阴道假丝酵母病局部用冲洗液的浓度是

- A、 2%~4%碳酸氢钠溶液
- B、 2%~3%碳酸氢钠溶液
- C、 4%~5%碳酸氢钠溶液
- D、 0.3%~0.5%碳酸氢钠溶液

E、 0.1%~0.5%碳酸氢钠溶液

答案： A

186、患者女, 51 岁, 主诉月经紊乱半年, 伴潮热, 焦虑、睡眠差, 就诊, 医嘱给予激素治疗, 患者询问激素替代治疗的主要目的是, 护士的正确回答是

- A、 调整周期
- B、 纠正与性激素不足有关的健康问题
- C、 促使卵巢功能的恢复
- D、 减少月经量
- E、 防止子宫内膜癌变

答案： B

187、痛经患者疼痛的性质主要是

- A、 针刺样疼痛
- B、 刀割样疼痛
- C、 坠胀痛
- D、 烧灼样疼痛
- E、 牵扯痛

答案： C

188、35 岁已婚妇女, 近年来, 月经周期 30~32 天, 月经持续 10~15 天, 经量时多时少。基础体温呈双相, 为明确诊断需行刮宫术, 时间应在

- A、 月经来潮前 1 周
- B、 月经来潮 12 小时内
- C、 月经第 3 天
- D、 月经第 5 天
- E、 月经来潮 24 小时内

答案： D

189、绝经过渡期功能失调性子宫出血妇女大量阴道出血时, 适宜的处理是

- A、 直接应用激素治疗
- B、 行刮宫术以排除子宫器质性病变
- C、 应用促排卵药物
- D、 直接行子宫切除术

E、 监测血常规

答案： B

190、告知患者激素替代疗法的禁忌证是

A、 不明原因的子宫出血

B、 骨质疏松

C、 冠心病

D、 子宫肌瘤切除

E、 冠心病一级预防

答案： A

191、双合诊指的是

A、 直肠和外阴的联合检查

B、 阴道和腹部的联合检查

C、 子宫和腹部的联合检查

D、 直肠和腹部的联合检查

E、 直肠和阴道的联合检查

答案： B

192、护士在行分段诊断性刮宫时,正确的顺序是

A、 先刮宫颈管,再探测宫腔及刮取子宫内膜

B、 先探测宫腔,后刮取宫颈管粘膜,再刮取子宫内膜

C、 先探测宫腔,再分别刮取前后左右四处的子宫内膜

D、 先刮取宫颈管粘膜,再刮取子宫内膜

E、 先探测宫腔,刮取子宫内膜,再刮取宫颈管粘膜

答案： A

193、随访葡萄胎患者时必须进行的常用检查方法是

A、 多普勒超声检查听取胎心

B、 B型超声检查有无胎囊

C、 CT 检查脑转移情况

D、 阴道脱落细胞涂片检查

E、 测尿中的 HCG 值

答案： E

194、某女, 28 岁, 已婚, 葡萄胎清宫术后 5 个月, 不规则阴道出血 3 个月, 伴咳嗽、咯血 1 周, 尿 HCG 阳性, 初步考虑为何种疾病:

- A、 宫外孕
- B、 流产
- C、 侵蚀性葡萄胎
- D、 肺结核
- E、 功血

答案： C

195、滋养细胞疾病最常见的转移器官是:

- A、 肾
- B、 肺
- C、 胃
- D、 肠
- E、 肝

答案： B

196、葡萄胎清宫术后 4 个月, hCG 持续阳性, 咯血, 首先考虑为

- A、 侵蚀性葡萄胎
- B、 葡萄胎
- C、 绒毛膜癌
- D、 不全流产
- E、 难免流产

答案： A

197、患者, 女, 28 岁, 妊娠 38 周, 患心脏病。刚临产, 产科情况暂无异常。心功能 II 级。在宫口接近开全时, 心功能仍为 II 级, 首先要做好是

- A、 准备抢救新生儿的物品
- B、 准备阴道助产手术的物品
- C、 产后压腹部的砂袋
- D、 产后注射的缩宫素
- E、 产后注射的吗啡

答案： B

198、某孕妇, 28 岁。妊娠 30 周, 测空腹血糖, 2 次均 $>5.8\text{mmol/L}$, 诊断为妊娠期糖尿病。该孕妇在妊娠期最不可能出现的并发症是

- A、 过期妊娠
- B、 妊高征
- C、 羊水过多
- D、 胎膜早破
- E、 泌尿系统感染

答案： A

199、子宫脱垂患者手术后应采取的体位是

- A、 侧卧位
- B、 半卧位
- C、 自由体位
- D、 头高脚低位
- E、 平卧位

答案： E

200、患者女性, 60 岁。体质较差, 普查发现并确诊为外阴鳞状细胞癌 0 期, 对患者进行治疗方案的解释, 最恰当的是

- A、 外阴癌对放疗敏感, 应选择放疗
- B、 为提高疗效, 行单纯性外阴切除术+双侧腹股沟浅淋巴结清扫术
- C、 考虑全身状况, 行单纯性外阴切除术
- D、 病变严重, 行外阴切除术+患侧淋巴结清扫术
- E、 为早期癌变, 行局部药物治疗

答案： C

201、患者女性, 38 岁, 孕 2 产 1, 2 年前产钳分娩, 长时间站立、下蹲后腰背酸痛有下坠感, 清洗外阴可及一肿物。妇科检查: 可看见宫颈已脱出阴道口, 宫体仍在阴道内。诊断为子宫脱垂几度

- A、 子宫脱垂 I 度轻型
- B、 子宫脱垂 I 度重型
- C、 子宫脱垂 II 度轻型
- D、 子宫脱垂 II 度重型

E、 子宫脱垂Ⅲ度

答案： C

202、护士指导子宫脱垂患者盆底肌肉组织锻炼的方法为

A、 下肢运动

B、 收缩肛门的运动

C、 仰卧起坐

D、 俯卧撑

E、 上肢运动

答案： B

203、患者女性, 38 岁, 体检时发现子宫脱出, 膀胱及直肠膨出。诊断为子宫脱垂, 患者非常紧张询问护士, 护士告知与发生子宫脱垂无关的是

A、 多产

B、 产伤

C、 产后过早参加体力劳动

D、 习惯性便秘

E、 手取胎盘

答案： E

204、放置子宫托的方法, 错误的是

A、 放置 3 天内不要取出, 以免错位

B、 大小以不脱落、无不适感为度

C、 局部溃疡治愈后再放托

D、 可取蹲位放置

E、 用托后第 1, 3, 6 个月各复查一次

答案： A

205、妊娠期血容量增加达高峰是在

A、 24~26 周

B、 27~28 周

C、 29~30 周

D、 32~34 周

E、 36~40 周

答案： D

206、下述哪种先露最多见

- A、 枕先露
- B、 肩先露
- C、 臀先露
- D、 面先露
- E、 足先露

答案： A

207、哪项属正常胎心音次数

- A、 100 次/分
- B、 80 次/分
- C、 105 次/分
- D、 170 次/分
- E、 132 次/分

答案： E

208、“黑加征”是指

- A、 子宫增大、变软
- B、 子宫呈后倾位
- C、 子宫峡部软, 子宫和宫颈似不相连
- D、 宫颈呈紫蓝色
- E、 乳头及乳晕着色加深

答案： C

209、胎儿先露部的指示点与母体骨盆前、后、左、右、横的关系, 称为

- A、 胎方位
- B、 胎产式
- C、 胎势
- D、 胎先露
- E、 横产式

答案： A

210、早孕反应一般在下列妊娠哪一阶段出现

- A、 6 周左右
- B、 8 周左右
- C、 10 周左右
- D、 11 周左右
- E、 12 周左右

答案： A

211、孕妇, 28 岁, 孕 30 周, 为了胎儿的健康安全, 产前检查的护士教会孕妇做胎动计数, 并嘱咐 12 小时胎动次数少于多少次时应及时就诊

- A、 10 次
- B、 20 次
- C、 30 次
- D、 40 次
- E、 50 次

答案： A

212、患者, 女性, 37 岁。因阴道分泌物增多及外阴瘙痒来就诊。诊断为滴虫性阴道炎, 拟采用自主冲洗器灌洗阴道的方法, 护士为其介绍使用方法时, 告知其最适宜的冲洗液是

- A、 5.5%醋酸溶液
- B、 2%呋喃西林
- C、 灭菌生理盐水
- D、 1%乳酸溶液
- E、 2%碳酸氢钠溶液

答案： D

213、细菌性阴道病的描述中, 不恰当的是

- A、 最常见的是金葡菌
- B、 阴道分泌物有腥臭味
- C、 胺臭味试验阳性
- D、 性伴侣不需常规治疗
- E、 可见线索细胞

答案： A

214、急性盆腔炎患者最重要的治疗手段是

- A、 卧床休息
- B、 手术治疗
- C、 抗生素治疗
- D、 中药治疗
- E、 放射疗法

答案： C

215、患者女性, 36 岁, 被诊断为慢性宫颈炎, 患者思想压力较大, 认为自己得了性病, 护士向她正确的解释慢性宫颈炎最常见的病变就是

- A、 宫颈糜烂
- B、 宫颈肥大
- C、 宫颈息肉
- D、 宫颈腺囊肿
- E、 宫颈管炎

答案： A

216、豆渣样白带常见于

- A、 老年性阴道炎
- B、 阿米巴阴道炎
- C、 幼年性阴道炎
- D、 滴虫性阴道炎
- E、 真菌性阴道炎

答案： E

217、高危妊娠是指

- A、 对孕妇、胎儿有较高危险性的妊娠
- B、 对新生儿有较高危险性的妊娠
- C、 对胎儿有较高危险性的妊娠
- D、 对孕妇有较高危险性的妊娠
- E、 对孕妇、胎儿和新生儿有较高危险性的妊娠

答案： E

218、如用电子胎心监护测胎心率,下列指标提示胎儿缺氧的是

- A、 变异减速
- B、 晚期减速
- C、 胎心率的波动范围在 10~25 次/min
- D、 早期减速
- E、 变异的频率为 6 次/min

答案: B

219、宫颈活检的护理要点,正确的是

- A、 月经期不宜检查,月经前期可行检查
- B、 术后 24 小时后患者自行取出棉球
- C、 生殖器急性炎症在积极抗感染下行检查
- D、 在碘着色区域钳取宫颈组织留检
- E、 术后禁性生活和盆浴 2 周

答案: B

220、为了解患者阴道、宫颈及分泌物等情况,应做的检查是

- A、 阴道窥器检查
- B、 双合诊检查
- C、 肛腹诊检查
- D、 外阴检查
- E、 三合诊检查

答案: A

221、有关妇科检查准备和注意事项,下述哪项不妥

- A、 男医生进行妇科检查,须有其他医务人员在场
- B、 查时应认真、仔细
- C、 防止交叉感染
- D、 未婚妇女做外阴视诊和肛腹诊
- E、 检查前应导尿

答案: E

222、第三产程结束后,为及时判断是否有产后出血,产妇应在产房继续停留

- A、 30 分钟
- B、 1 小时
- C、 2 小时
- D、 3 小时
- E、 5 小时

答案： C

223、宫缩的特点,下列不正确的是

- A、 对称性
- B、 节律性
- C、 随意性
- D、 极性
- E、 缩复作用

答案： C

224、第三产程处理错误的是

- A、 胎儿娩出后应立即挤压子宫,促使胎盘娩出
- B、 胎盘娩出后详细检查胎盘、胎膜是否完整
- C、 检查阴道、会阴有无裂伤
- D、 第三产程结束后,产妇在产房观察 2h
- E、 产后 2h 情况良好,护送到休养室

答案： A

225、衔接是指胎头

- A、 进入中骨盆
- B、 顶骨进入骨盆入口平面
- C、 双顶径进入骨盆入口平面
- D、 顶骨已出骨盆出口平面
- E、 双顶径达中骨盆平面

答案： C

226、解女士, 25 岁, 妊娠 39 周, 于 2:30 正常分娩, 6:40 病人主诉下腹胀、痛。视诊:下腹膀胱区隆起;叩诊:耻骨联合上鼓音, 病人存在的健康问题是

- A、 分娩后疼痛

- B、 体液过多
- C、 排尿异常
- D、 尿潴留
- E、 胎膜残留

答案： D

227、初产妇, 28 岁。足月妊娠临产, 2 小时前肛查宫口开 4cm, 现肛查宫口仍开 4cm, 检查: 宫缩 7~8 分钟一次, 持续时间 30 秒, 胎膜未破, 其余无异常。若进行人工破膜, 应在什么情况下进行

- A、 宫缩时
- B、 孕妇屏气时
- C、 宫缩间歇时
- D、 孕妇深呼吸时
- E、 孕妇喊叫时

答案： C

228、初产妇, 28 岁。足月妊娠临产, 2 小时前肛查宫口开 4cm, 现肛查宫口仍开 4cm, 检查: 宫缩 7~8 分钟一次, 持续时间 30 秒, 胎膜未破, 其余无异常。破膜 1 小时后观察到的宫缩仍为 7~8 分钟一次, 持续时间 30 秒, 应采取的措施是

- A、 静脉滴注催产素
- B、 嘱孕妇向下用力
- C、 会阴侧切
- D、 给予镇静剂
- E、 产钳助产

答案： A

229、一产妇足月妊娠, 胎儿估计 4000g, 临产后 20 小时, 胎头为坐骨棘下 1cm, 宫口开全、尾骨前翘, 耻骨弓角度低出口横径加后矢状径<15cm。该产妇最可能是

- A、 骨盆入口狭小
- B、 骨盆中骨盆平面狭窄
- C、 骨盆出口狭窄
- D、 子宫收缩乏力
- E、 胎儿过大

答案： C

230、一产妇足月妊娠, 胎儿估计 4000g, 临产后 20 小时, 胎头为坐骨棘下 1cm, 宫口开全、尾骨前翘, 耻骨弓角度低, 出口横径加后矢状径 $<15\text{cm}$ 。术中要警惕, 防止损伤

- A、 膀胱和输尿管
- B、 尿道
- C、 直肠
- D、 阑尾
- E、 小肠

答案： A

231、关于协调性子宫收缩乏力, 下列说法正确的是

- A、 子宫收缩极性倒置
- B、 产程常延长
- C、 不易发生胎盘滞留
- D、 不宜静脉滴注催产素
- E、 子宫中段收缩比宫底强

答案： B

232、子宫收缩乏力的止血措施首选

- A、 宫腔填塞纱布条
- B、 按摩子宫并注射缩宫素
- C、 压迫腹主动脉
- D、 结扎子宫动脉
- E、 子宫切除术

答案： B

233、孕妇, 30 岁, 妊娠 38 周, 第一胎。规律性腹痛 3 小时入院待产。胎方位为单臀位, 估计胎儿重 3000g, 骨盆外测量正常。护士对患者家属解释臀位最易发生的并发症是

- A、 新生儿窒息
- B、 胎膜早破、脐带脱垂
- C、 产后出血
- D、 胎盘植入

E、 宫颈撕裂

答案： B

234、有血管病变的孕妇,易发生

A、 前置胎盘

B、 胎盘早剥

C、 异位妊娠

D、 羊水过多

E、 过期妊娠

答案： B

235、前置胎盘诊断成立的孕周是妊娠：

A、 24 周后

B、 26 周后

C、 28 周后

D、 30 周后

E、 32 周后

答案： C

236、某孕妇妊娠 38 周，为判断其胎盘功能，应：

A、 测定羊水中卵磷脂 / 鞘磷脂比值

B、 测定血或尿中雌三醇值

C、 测定血中 hCG 值

D、 测定羊水中肌酐值

E、 测定羊水中脂肪细胞值

答案： B

237、双合诊指的是：

A、 直肠和外阴的联合检查

B、 阴道和腹部的联合检查

C、 子宫和腹部的联合检查

D、 直肠和腹部的联合检查

E、 直肠和阴道的联合检查

答案： B

238、1. 前置胎盘阴道流血的特点哪项错误：

- A、 常发生在妊娠晚期
- B、 无痛性阴道流血
- C、 胎盘位置越低，出血越多
- D、 贫血程度与阴道流血量成正比
- E、 出血发生的早晚与前置胎盘的类型无关

答案： E

239、2. 妊娠满 28 周不满 37 周终止者，称为：

- A、 流产
- B、 . 早产
- C、 足月产
- D、 过期产
- E、 难产

答案： B

240、有关妇科双合诊检查, 哪项是错的

- A、 用具消毒, 防止交叉感染
- B、 适于所有妇科病人
- C、 取膀胱截石位
- D、 先排空膀胱
- E、 是妇科最常用检查方法

答案： B

241、某基层卫生院让你配备几项妇科检查用物, 下列哪项不需要

- A、 消毒肥皂水和生理盐水
- B、 无菌手套
- C、 骨盆测量器
- D、 宫颈刮板、玻片
- E、 阴道窥器

答案： C

242、下列药物,不能抑制宫缩的是

- A、 β 肾上腺素受体激动剂
- B、 硫酸镁
- C、 钙拮抗剂
- D、 前列腺素合成酶
- E、 前列腺素合成酶抑制剂

答案: D

243、关于子宫破裂,下列正确的是:

- A、 按疾病发展的过程,可分为先兆子宫破裂和子宫破裂两阶段
- B、 先兆子宫破裂多发生在宫缩乏力所致的产程延长
- C、 对于子宫破裂的产妇,应积极进行全子宫切除术
- D、 发生在妊娠期

答案: A

244、正常分娩时为预防产后出血,静脉催产素应在:

- A、 胎头拨露阴唇后联合紧张时
- B、 胎头着冠时
- C、 胎头娩出时
- D、 胎肩娩出时

答案: D

245、某产妇,25岁,足月顺产,当胎儿娩出后即发生阴道持续性出血,量约500ml,呈鲜红色,很快凝成血块,查宫缩良好。此出血原因为

- A、 胎盘剥离不全
- B、 胎盘残留
- C、 子宫收缩乏力
- D、 软产道裂伤
- E、 凝血功能障碍

答案: D

246、某产妇,孕1产0,28岁,妊娠29周,胎膜早破。在医院保胎治疗过程中,突发寒战、恶心、呕吐和气急等症状,继而出现呛咳、呼吸困难和发绀,进入昏迷状态,以后皮肤出现血斑。最可能是

- A、 胎盘早剥
- B、 胎膜早破
- C、 羊水栓塞
- D、 先兆子宫破裂
- E、 早产

答案： C

247、子宫破裂

- A、 少量阴道流血, 伴轻微下腹痛, 宫颈口未开
- B、 分娩阻滞, 剧烈疼痛, 宫缩停止, 病情恶化
- C、 阴道出血量和贫血程度不一致, 伴腹痛
- D、 妊娠晚期或临产时无痛性反复阴道出血
- E、 妊娠产物完全排出, 阴道流血停止

答案： B

248、易引起子宫破裂的胎位是：

- A、 单臀位
- B、 枕横位
- C、 横位
- D、 枕后位

答案： C

249、某产妇, 妊娠 38 周, 产前合并有轻度妊娠期高血压疾病, 产后阴道持续出血, 胎儿娩出后 24 小时出血量达 600ml, 检查子宫软, 按摩后子宫变硬, 阴道流血减少, 该产妇诊断为产后出血。造成该产妇产后出血的最可能原因是

- A、 子宫收缩乏力
- B、 胎盘残留
- C、 软产道裂伤
- D、 凝血功能障碍
- E、 胎膜残留

答案： A

250、某初产妇, 自临产至宫口扩大 2cm 共耗 19 小时, 从此至宫口开全共耗 10 小时, 经过处理后产下一男婴, 其心率为 110 次/分, 呼吸不规则, 四肢稍屈, 清理呼吸道时有咳嗽反应存在, 皮肤颜色红润该男婴的 Apgar 评分值是

- A、 4 分
- B、 5 分
- C、 7 分
- D、 8 分
- E、 6 分

答案： D

251、张女士, 28 岁, 第一胎, 孕足月, 今晨产钳助娩一男婴, 体重 3.5kg。出生后 Apgar 评分 7 分, 该新生儿护理措施中不妥的是:

- A、 严密观察面色、呼吸、哭声
- B、 补充营养、必要时静脉补液
- C、 保持清洁, 每天淋浴
- D、 常规使用维生素 K, 肌注
- E、 3 天后情况正常可以喂奶

答案： C

252、患者, 女性, 35 岁, 停经 41 周, 规律腹痛 10 小时, 阴道流血 3 小时, LOA, 胎心 150 次/分, 宫口开大 7cm, 入院后 2.5 小时, 产程无进展。以下诊断正确的是

- A、 胎膜早破
- B、 过期妊娠
- C、 潜伏期延长
- D、 活跃期停滞
- E、 滞产

答案： D

253、以下不属于产力的是

- A、 肛提肌收缩力
- B、 腹肌收缩力
- C、 坐骨海绵体肌收缩力
- D、 膈肌收缩力
- E、 子宫收缩力

答案： C

254、分娩能否顺利进行的主要因素有

- A、 产力
- B、 产道
- C、 胎儿
- D、 产妇的精神心理状态
- E、 . 产妇的体质状况

答案： D

255、衔接是指

- A、 胎头双顶径进入骨盆出口平面, 胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平
- B、 胎头双顶径进入骨盆入口平面, 胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平
- C、 胎头枕下前囟径进入骨盆入口平面, 胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平
- D、 胎头枕额径进入骨盆入口平面, 胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平
- E、 胎头枕颞径进入骨盆入口平面, 胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平

答案： B

256、某产妇, 26 岁, 第一胎, 足月临产 14h, 肛查: 宫口开全, 胎膜已破, 胎方位正常, 先露头, 双顶径达坐骨棘水平, 胎心音正常。在处理中首先考虑是

- A、 陪伴在产妇身旁, 指导使用腹压
- B、 观察胎头是否已达到阴道口
- C、 准备产包
- D、 消毒外阴
- E、 洗手准备接生

答案： A

257、胎儿娩出后, 可用高锰酸钾消毒脐带断面, 高锰酸钾的浓度是

- A、 5%
- B、 10%
- C、 15%
- D、 20%
- E、 25%

答案： D

258、间接测量卵巢功能的为

- A、 子宫输卵管碘油造影

- B、 宫颈刮片检查
- C、 B 型超声检查
- D、 阴道分泌物悬滴检查
- E、 宫颈粘液检查

答案： E

259、不属于子宫颈癌晚期症状和体征的是

- A、 脓性或米汤样恶臭白带
- B、 下肢和腰骶部出现持续性疼痛
- C、 腹水
- D、 恶病质
- E、 阴道流血

答案： C

260、确诊宫颈癌最可靠的辅助检查方法是

- A、 宫颈刮片细胞学检查
- B、 碘试验
- C、 宫颈和宫颈管活体组织检查
- D、 阴道镜检查
- E、 B 型超声

答案： C

261、患者女性, 51 岁。近 3 个月有阴道接触性出血, 偶有血性白带。妇科检查: 宫颈轻度糜烂, 有接触性出血, 子宫、附件(一)。患者担心自己患宫颈癌, 咨询早期发现该病的有效方法, 护士的回答是

- A、 宫颈刮片检查
- B、 宫颈锥切病检
- C、 三合诊检查
- D、 分段诊断性刮宫
- E、 双合诊检查

答案： A

262、患者女性, 45 岁, 体检 B 超发现子宫浆膜下肌瘤, 询问护士该肌瘤最常见的临床表现, 护士告知

- A、 下腹部包块
- B、 不孕
- C、 腰酸
- D、 月经量过多
- E、 白带增多

答案： A

263、有关卵巢周期变化,下述哪项不对

- A、 排卵发生在月经来潮前 14 天左右
- B、 如卵子未受精,黄体于排卵后 9~10 天萎缩
- C、 黄体衰退,月经即来潮
- D、 黄体细胞分泌雌、孕激素
- E、 排卵后 7~8 天黄体发育达到高峰

答案： B

264、患者女性,43 岁。诊断为子宫内膜下肌瘤,主诉头晕、乏力,导致这一症状最可能的原因是

- A、 心理作用
- B、 继发性贫血所致
- C、 对手术的恐惧
- D、 肌瘤蒂扭转所致
- E、 压迫直肠所致

答案： B

265、卵子自卵巢排出后如未受精,黄体开始萎缩,萎缩发生的时间是在排卵后

- A、 4~5 天
- B、 7~8 天
- C、 9~10 天
- D、 11~12 天
- E、 13~14 天

答案： C

266、某女士,37 岁,G3P0,孕 32 周,本次妊娠为试管婴儿,“因头晕、视物模糊 2d”到产科门诊就诊。查体:身高 155cm,体重 82kg,BP 160/108mmHg,双下肢水

肿(+++), 宫高 31cm, 腹围 86cm, 胎方位 ROA, 胎心 145 次/min。辅助检查: 血红蛋白 88g/L, 蛋白尿(+++)。初中文化水平, 孕前体重 68kg, 曾自然流产 2 次。该孕妇为分级管理的哪一类?

- A、 绿色
- B、 黄色
- C、 橙色
- D、 红色
- E、 紫色

答案: C

267、胎心减速出现在宫缩开始时, 宫缩后恢复正常, 时间短、恢复快, 是因为

- A、 胎儿受镇静剂影响
- B、 脐带受压, 兴奋迷走神经
- C、 胎儿严重缺氧
- D、 胎儿状况良好
- E、 胎头受压, 脑血流量一时性减少

答案: E

268、下列关于变异减速描述正确的是:

- A、 FHR 曲线下降与宫缩曲线上升几乎同时
- B、 下降幅度>70 次/分
- C、 持续时间<15 秒
- D、 宫缩后恢复时间长
- E、 提示胎头可能受压

答案: B

269、子宫脱垂患者手术后应采取的体位是

- A、 侧卧位
- B、 半卧位
- C、 自由体位
- D、 头高脚低位
- E、 平卧位

答案: E

270、放置子宫托的方法, 错误的是

- A、 放置 3 天内不要取出, 以免错位
- B、 大小以不脱落、无不适感为度
- C、 局部溃疡治愈后再放托
- D、 可取蹲位放置
- E、 用托后第 1, 3, 6 个月各复查一次

答案: A

271、下列哪种情况禁止放置宫内节育器

- A、 生殖道炎症
- B、 月经紊乱
- C、 可疑妊娠者
- D、 铜过敏史者
- E、 以上都是

答案: E

272、可采用口服避孕药避孕的妇女是

- A、 46 岁健康妇女
- B、 33 岁产后 1 年妇女
- C、 25 岁再生障碍性贫血患者
- D、 37 岁吸烟妇女
- E、 31 岁哺乳期妇女

答案: B

273、何某, 46 岁, 近来月经紊乱, 咨询避孕措施。应指导其选用

- A、 宫内节育器
- B、 口服避孕药
- C、 注射避孕针
- D、 阴茎套
- E、 安全期避孕

答案: B

274、关于无排卵性功血的叙述, 正确的是

- A、 诊刮只是诊断,不可以止血
- B、 基础体温呈双相型
- C、 宫颈黏液结晶检查可见椭圆体
- D、 月经来潮 24 小时内刮宫可确定排卵和黄体功能
- E、 青春期及生育期无排卵性功血治疗原则以止血、调整周期、促进排卵

答案: E

275、痛经患者疼痛的性质主要是

- A、 针刺样疼痛
- B、 刀割样疼痛
- C、 坠胀痛
- D、 烧灼样疼痛
- E、 牵扯痛

答案: C

276、黄体功能不足为

- A、 经前诊断性刮宫呈分泌型
- B、 子宫内膜为蜕膜
- C、 经期内刮宫为混合型
- D、 经前诊断性刮宫呈增生型
- E、 经前诊断性刮宫子宫内膜呈分泌不良

答案: E

277、患者女性,28 岁。发育正常,婚后夫妇同居,3 年未孕。诊断为原发性不孕。原发性不孕是指

- A、 育龄妇女,婚后性生活正常,未避孕,同居 2 年未孕者
- B、 育龄妇女,婚后性生活正常,未避孕,同居 1 年未孕者
- C、 夫妇同居,性生活正常,虽第一次婚姻曾生育,此后未避孕,2 年未孕者
- D、 夫妇同居,性生活正常,虽第一次婚姻曾生育,此后未避孕,1 年未孕者
- E、 夫妇同居后 1 年未孕,一方有无法纠正的解剖生理缺陷者

答案: A

278、原发性痛经的健康宣教应告知患者

- A、 合理休息,充足睡眠,摄取足够的营养

- B、 增加运动, 减少睡眠, 进食清淡饮食
- C、 减少运动, 充足睡眠, 增加饮食
- D、 增加运动, 充足睡眠, 减少饮食
- E、 运动、睡眠, 饮食无特殊变化

答案: A

279、下列有关功血病人的治疗原则, 正确的是

- A、 青春期功血者用雌激素止血
- B、 围绝经期功血用雄激素止血效果好
- C、 调整周期恢复排卵是青春期功血者的治疗目的
- D、 围绝经期功血者止血后需要调整月经促排卵治疗
- E、 围绝经期功血者用雌激素止血效果最好

答案: C

280、排卵后使基础体温升高 0.3-0.5℃的激素是

- A、 促卵泡素
- B、 雌激素
- C、 孕激素
- D、 雄激素
- E、 肾上腺素

答案: C

281、固定子宫颈于正常位置的子宫韧带是:

- A、 宫骶韧带
- B、 主韧带
- C、 阔韧带
- D、 圆韧带
- E、 骶结节韧带

答案: B

282、关于子宫的解剖, 下述哪项正确

- A、 非孕期子宫峡部为 1cm
- B、 子宫底与子宫颈相接处为峡部

- C、 成年女性子宫长 9~10cm
- D、 容积约为 10ml
- E、 位于骨盆中央,坐骨棘水平以下

答案: A

283、关于会阴的描述,正确的是

- A、 会阴组织妊娠时的延展性差,分娩时容易裂伤
- B、 会阴体厚 3~4cm,呈楔状
- C、 广义的会阴前方为耻骨联合上缘
- D、 狭义的会阴是指尿道口与肛门之间的软组织
- E、 会阴包括皮肤、肌肉、筋膜及骨骼

答案: B

284、某女士,已婚,月经规律,月经周期第 28 天取子宫内膜检查所见:腺体缩小,内膜水肿消失,螺旋小动脉痉挛性收缩,有坏死、破裂,内膜下血肿。该内膜为

- A、 月经期
- B、 增生期
- C、 分泌早期
- D、 分泌期
- E、 月经前期

答案: E

285、下列不属于女性内生殖器官的是

- A、 阴阜
- B、 卵巢
- C、 输卵管
- D、 阴道
- E、 子宫

答案: A

286、月经的第 15~28 天,称为

- A、 月经期
- B、 增生期

- C、 分泌期
- D、 月经前期
- E、 月经周期

答案： C

287、成年妇女宫体与宫颈的比例为

- A、 1:1
- B、 1:2
- C、 1:3
- D、 2:1
- E、 3:1

答案： D

288、对于不全流产孕妇,一经确诊,护士需

- A、 及时做好清除宫内残留组织的准备
- B、 嘱孕妇休息
- C、 继续监测胚胎发育情况
- D、 减少刺激
- E、 加强心理护理,增强保胎信心

答案： A

289、下列与异位妊娠无关的临床表现是

- A、 停经
- B、 阴道流血
- C、 下肢水肿
- D、 晕厥与休克
- E、 腹痛

答案： C

290、某女士,第一胎,孕 36 周,昨晚仰卧位睡觉,起床时突然阴道出血,量约 10ml,无明显腹痛。检查:血压 120/70mmHg,宫高与孕月相符,腹软无压痛,胎位清楚,胎心音 130 次/分,诊断较安全可靠的方法是

- A、 期待疗法,完善检查,密切监测
- B、 药物引产

- C、 立即人工破膜
- D、 剖宫产术
- E、 催产素静脉滴注

答案： A

291、育龄妇女停经 58 天后,阴道流血 3 天,血量增多 5 小时,伴腹痛下坠,妇检子宫增大如孕 50 天大小,软,宫口开一指,尿妊娠试验阳性,应首先考虑

- A、 先兆流产
- B、 难免流产
- C、 不完全流产
- D、 过期流产
- E、 葡萄胎

答案： B

292、某孕妇,28 岁,孕 34 周。因“头晕、头痛”就诊。查体:血压 160/115mmHg,实验室检查,水肿(+),尿蛋白定量 5.5g/24h,临床诊断为重度子痫前期。首选的解痉药物是

- A、 地西洋
- B、 阿托品
- C、 硫酸镁
- D、 冬眠合剂
- E、 卡托普利

答案： C

293、先兆子痫出现剧烈头痛时应先选

- A、 杜冷丁(哌替啶)
- B、 硫酸镁
- C、 甘露醇
- D、 安定(地西洋)
- E、 肼苯哒嗪

答案： B

294、患者女性,30 岁。平素月经规律,现停经 56 天,近 1 周来,下腹疼痛,阴道少量流血,尿妊娠试验(+),给予保胎治疗。昨天起体温 38.5℃,下腹痛加剧。妇

科检查:阴道少量暗红色积血,宫口闭,子宫如孕6周大小。触痛两侧附件增厚,触痛,白细胞计数 $18 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.94,此时应对患者给予

- A、刮宫术
- B、卧床休息
- C、抗生素
- D、缩宫素静脉滴注
- E、安宫黄体酮(甲羟孕酮)口服

答案: C

295、可促进胎儿肺成熟的药物是

- A、利托君
- B、硫酸镁
- C、地塞米松
- D、维生素
- E、维生素K

答案: C

296、患者女性,26岁。在妊娠5个月时体格检查尿糖(+++),空腹血糖 7.7mmol/L ,随机血糖 16.7mmol/L 。该患者药物治疗选用

- A、磺脲类降糖药
- B、双胍类降糖药
- C、葡萄糖苷酶抑制剂
- D、噻唑烷二酮
- E、胰岛素

答案: E

297、每次宫缩,被挤人体循环的血液量大约为

- A、 $50 \sim 100\text{ml}$
- B、 $150 \sim 200\text{ml}$
- C、 $200 \sim 250\text{ml}$
- D、 $250 \sim 500\text{ml}$
- E、 $500 \sim 600\text{ml}$

答案: D

298、某妊娠合并糖尿病产妇,孕期无其它合并症。于妊娠 39 周剖宫产一健康男婴,对于该新生儿应重点监测的内容是

- A、 大小便
- B、 体重
- C、 黄疸
- D、 血糖
- E、 体温

答案: D

299、关于妊娠合并心脏病叙述不对的是

- A、 妊娠合并心脏病是孕产妇死亡的主要原因
- B、 妊娠 32-34 周血容量增加达高峰
- C、 分娩第二期比第一期心脏负担重
- D、 分娩第三期心脏负担仍很重
- E、 产后 2-3 天心脏负担减轻

答案: E

300、对妊娠合并心脏病产妇产后的护理中,错误的是

- A、 心功能 I~II 级者可哺乳,但应避免过度劳累
- B、 产后住院期与正常分娩者相同
- C、 产后 24h 绝对卧床休息
- D、 心功能 III~IV 级者应劝其绝育
- E、 严密观察心功能情况

答案: B

301、患者女性,足月妊娠,规律性腹痛 10 小时,检查宫口开大 5cm。先露部头居棘上 1cm。大囟门位于 8 点,小囟门位于 2 点,下述胎位最正确的是

- A、 枕左前位
- B、 枕左后位
- C、 枕右前位
- D、 枕右后位
- E、 高直后位

答案: A

302、早孕反应不包括

- A、 喜食酸物
- B、 食欲减退
- C、 恶心
- D、 呕吐
- E、 失眠

答案： E

303、产妇, 27 岁, 正常阴道分娩, 护士给护生讲解正常的脐带结构是

- A、 一条动脉, 一条静脉
- B、 一条动脉, 二条静脉
- C、 二条动脉, 一条静脉
- D、 静脉较粗壁厚
- E、 动脉较细壁薄

答案： C

304、患者, 女性, 25 岁, 已婚, 月经规律。现停经 42 天, 体温 37.0℃, 主诉晨起恶心、呕吐, 并伴有咳嗽、头痛。护士考虑最可能的情况是

- A、 上呼吸道感染
- B、 早孕
- C、 急性胃肠炎
- D、 尿道感染
- E、 闭经

答案： B

305、关于羊水检查描述, 正确的是

- A、 胆红素类物质值 <0.02 提示胎儿胆囊成熟
- B、 羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值 >2 提示胎儿神经系统发育成熟
- C、 肌酐值 $176.85 \mu\text{mol/L}$ 提示胎儿肾成熟
- D、 淀粉酶值 450IU/L 提示胎儿胰腺成熟
- E、 脂肪细胞出现率达 20%提示胎儿肌肉已成熟

答案： C

306、B 超显像检查, 妊娠几周才可见到妊娠环

- A、 2 周
- B、 3 周
- C、 4 周
- D、 5 周
- E、 6 周

答案： D

307、与囊胚极滋养层接触的蜕膜是

- A、 包蜕膜
- B、 Apgar 评分法
- C、 真蜕膜
- D、 底蜕膜
- E、 Manning 评分法

答案： D

308、孕 30 周, 骶左前位, 胎心音听诊部位应在

- A、 脐下左侧
- B、 脐下右侧
- C、 脐上右侧
- D、 脐上左侧
- E、 脐周

答案： D

309、侵蚀性葡萄胎病人的处理原则为

- A、 核素治疗
- B、 以化疗为主
- C、 子宫切除
- D、 子宫及附件切除
- E、 进行放疗

答案： B

310、葡萄胎排出后随访时下述哪项是不需要的

- A、 至少避孕 2 年

- B、 定期做 HCG 定量测定
- C、 定期做胸部 X 线摄片
- D、 定期做阴道细胞学检查
- E、 定期做妇科检查

答案： D

311、葡萄胎病人随访时间至少

- A、 2 年
- B、 4 年
- C、 1 年
- D、 3 年
- E、 半年

答案： A

312、葡萄胎清宫术后 4 个月, hCG 持续阳性, 咯血, 首先考虑为

- A、 侵蚀性葡萄胎
- B、 葡萄胎
- C、 绒毛膜癌
- D、 不全流产
- E、 难免流产

答案： A

313、在手术切除的标本病理检查中, 发现子宫肌层及输卵管中有滋养细胞并显著增生成团块状; 细胞大小、形态均不一致; 有出血及坏死; 但绒毛结构完整。最可能的诊断为

- A、 卵巢肿瘤
- B、 侵蚀性葡萄胎
- C、 子宫体癌
- D、 绒毛膜癌
- E、 葡萄胎

答案： B

314、滴虫性阴道炎直接传染的方式是

- A、 妇科检查器具

- B、 公共浴池
- C、 坐式马桶
- D、 性交
- E、 游泳池

答案： D

315、患者欲了解有关梅毒的知识, 正确解释是

- A、 主要由性行为传播, 不能通过污染衣物间接传染
- B、 病原体抵抗力较强, 对化学消毒剂不敏感
- C、 一种全身病变的性传播疾病
- D、 病原体不耐热, 50℃1 分钟内死亡
- E、 可经产道传播, 但不能通过胎盘

答案： C

316、患者女性, 29 岁, 外阴不适, 辅助检查: 氨试验: 有烂鱼样腥臭味。线索细胞检查线索细胞>20%时为阳性。阴道 pH 值检查: 在 4.7~5.7, 护士告知患者所患疾病最可能是

- A、 细菌性阴道病
- B、 外阴阴道假丝酵母病
- C、 外阴瘙痒症
- D、 非特异性阴道炎
- E、 滴虫性阴道炎

答案： A

317、如孕妇已足月妊娠, 患外阴、阴道、宫颈尖锐湿疣, 最恰当的处理措施是

- A、 阴道分娩困难再剖宫产
- B、 经阴道分娩
- C、 先治疗尖锐湿疣后剖宫产
- D、 先治疗尖锐湿疣后经阴道分娩
- E、 剖宫产

答案： E

318、阴道有大量稀薄泡沫状白带, 最可能的疾病是

- A、 淋病

- B、滴虫性阴道炎
- C、老年性阴道炎
- D、前庭大腺炎
- E、阴道假丝酵母菌病

答案： B

319、确诊前置胎盘的方法是

- A、阴道检查
- B、肛门检查
- C、B超检查
- D、放射线检查
- E、化验检查

答案： C

320、孕妇,妊娠 28 周,因意外碰撞出现持续性腹痛,查体:子宫硬如板状,有压痛,子宫比妊娠周数大,阴道无流血,胎心、胎动消失。诊断为重型胎盘早剥。通过以上病历分析,该孕妇最易出现的并发症是

- A、心衰
- B、呼吸窘迫综合征
- C、羊水过少
- D、弥漫性血管内凝血
- E、胎膜早破

答案： D

321、初孕妇,27 岁,妊娠 37 周,阴道无痛性反复阴道流血 1 天,流血量超过 500ml,检查枕左前位,胎心 120 次/分,无规律宫缩。最恰当的处理是

- A、期待疗法
- B、药物引产
- C、立即人工破膜
- D、剖宫产术
- E、催产素静脉滴注

答案： D

322、重度胎盘早剥患者的护理措施不正确的是

- A、 给予适当的卧床休息,减少刺激
- B、 为终止妊娠做准备
- C、 预防产后出血
- D、 严密观察有无凝血功能障碍或急性肾衰竭的表现
- E、 做好产褥期的各项护理

答案: A

323、下列关于胎盘早剥说法错误的是:

- A、 是妊娠晚期严重并发症
- B、 胎盘剥离早于胎儿娩出
- C、 胎盘位置是正常的
- D、 发生在妊娠 28 周后

答案: D

324、患者女, 35 岁。G3P0, 妊娠 37 周, 夜间醒后发现阴道流血量多, 无腹痛, 妊娠 20 周后反复出血 4 次, 给予保胎治疗, 子宫软, 压痛(-), 无宫缩, 胎位 LSA, 臀部位于耻骨联合上方高浮, 胎心 140 次/分, 耻骨联合上方闻及胎盘杂音, 最可能的诊断是

- A、 中央性前置胎盘
- B、 部分性前置胎盘
- C、 边缘性前置胎盘
- D、 低置前置胎盘
- E、 轻度胎盘早剥

答案: A

325、胎盘早剥的处理原则是

- A、 减轻腹痛
- B、 减少出血
- C、 抑制宫缩
- D、 期待疗法, 等待自然分娩
- E、 纠正休克, 及时终止妊娠

答案: E

326、下列哪项是前置胎盘的典型表现

- A、 妊娠期因外伤持续性腹痛,伴有阴道流血
- B、 血压升高
- C、 血压下降、贫血
- D、 胎儿宫内窘迫
- E、 妊娠期或临产时,无痛性无诱因反复阴道流血

答案: E

327、急产不可能造成的后果是:

- A、 软产道组织受压缺血、坏死
- B、 会阴、阴道裂伤
- C、 新生儿颅内出血
- D、 子宫破裂
- E、 产褥感染

答案: A

328、患者女性,28岁。G3P0,孕40周,因臀位行臀牵引术,胎儿娩出后5分钟突发阴道多量出血约400ml,检查血压100/60mmHg,脉率100次/分,宫底脐平,应选择的方式是

- A、 行人工胎盘剥离术
- B、 静脉输注缩宫素
- C、 检查软产道有无损伤
- D、 纱布填塞宫腔
- E、 按摩子宫

答案: A

329、滞产是指

- A、 总产程超过24小时
- B、 宫口开大3cm至宫口开全超过8小时者
- C、 总产程不超过3小时
- D、 宫口开全后初产妇超过2小时,经产妇超过1小时尚未分娩者
- E、 从临产至宫口开大3cm,超过16小时者

答案: A

330、持续性枕后位的主要原因是

- A、 中骨盆狭窄
- B、 胎头俯屈不良
- C、 胎儿相对过大
- D、 子宫收缩过弱
- E、 单纯扁平骨盆

答案： A

331、分娩时产妇过早使用腹压易导致

- A、 产程加速
- B、 胎儿窘迫
- C、 胎膜早破
- D、 产妇疲劳和宫颈水肿
- E、 羊水混浊

答案： D

332、患者,女,产后 8 小时产妇还不能自行排尿,宫底下方扪及囊性包块,说明有尿潴留。下列处理错误的是

- A、 让产妇听流水声
- B、 帮助其下床排尿
- C、 按摩膀胱或针刺三阴交、气海、关元等穴位
- D、 用温水冲洗会阴部
- E、 首先导尿

答案： E

333、关于产妇产后会阴护理的描述,正确的是

- A、 会阴部有水肿者,可用 50%硫酸镁湿热敷
- B、 可使用 1:500 碘附溶液冲洗
- C、 嘱产妇向会阴伤口侧卧,以便于分泌物流出
- D、 可使用 1:500 高锰酸钾溶液冲洗
- E、 可使用 1:200 苯扎溴铵溶液冲洗

答案： A

334、患者 25 岁,子痫,G1P1,产后 2 天,外阴水肿仍未消退操作时不需要准备的用具是

- A、 一次性垫单
- B、 治疗用液体
- C、 纱布垫
- D、 橡皮管
- E、 治疗碗

答案： D

335、产褥期护理措施, 下述哪项不对

- A、 测体温. 脉搏. 呼吸, 每日 2 次
- B、 产后适宜多取蹲位
- C、 产后 24 小时鼓励产妇产下床活动
- D、 饮食应富有营养
- E、 产妇应多吃蔬菜水果

答案： B

336、关于纯母乳喂养的概念, 错误的是

- A、 哺乳后将新生儿横抱, 轻拍背部
- B、 除母乳外不添加任何食物
- C、 母乳不必定时
- D、 产妇哺乳时取侧卧位或坐位
- E、 不要使用奶头安慰物

答案： A

337、李某, 经产妇, 昨日经阴道顺产一正常男婴, 目前诉说乳房胀痛, 下腹阵发性轻微疼痛。查乳房肿胀, 无红肿, 子宫硬, 宫底在腹正中, 脐下 2 指, 阴道出血同月经量。该孕妇乳房胀痛首选的护理措施是

- A、 生麦芽煎汤喝
- B、 让新生儿多吸吮
- C、 芒硝敷乳房
- D、 少喝汤水
- E、 用吸奶器吸乳

答案： B

338、某产妇,足月产后3天,出现下腹痛,体温不高,恶露多,有臭味,子宫底脐上1指,子宫体软。考虑其最可能的病理是

- A、 子宫肌炎
- B、 子宫内膜炎
- C、 急性输卵管炎
- D、 腹膜炎
- E、 盆腔结缔组织炎

答案: B

339、某产妇,足月产后3天,出现下腹痛,体温不高,恶露多,有臭味,子宫底位于脐上1指,子宫体软。以下护理措施中,错误的是

- A、 做好会阴护理
- B、 半卧位或抬高床头
- C、 监测体温变化
- D、 做好心理支持
- E、 红外线照射会阴部每日3次,每次1小时

答案: E